

2012年7月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

滋養強壮剤  
プラセンタ製剤

第2類医薬品

## 疲れ・だるさに ラ・ビアンVX錠

胎盤を化学的に処理してえられる加水分解物、胎盤を乾燥させた乾燥微粉末、そしてビタミン類（ビタミンB<sub>1</sub>類：チアミンジスルフィド、ビタミンB<sub>2</sub>、ビタミンB<sub>6</sub>、ビタミンE）、さらに和漢薬類（反鼻末、胆汁末、ロクジョウ末、地黄軟エキス、トウキエキスS、オウギエキス）を配合した製剤です。

滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給にすぐれた効果を発揮します。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	かゆみ、発疹
その他	生理異常

- しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 【効 能】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給


### 【用法・用量】

年齢	大人(15才以上)	15才未満
1回量	3錠 	服用させないこと 
服用回数	1日2回	

### 【用法・用量に関連する注意】

定められた用法・用量を守ってください。

### 【PTP包装の場合の錠剤の取り出し方】



突き出した透明な部分を指先でアルミ箔の方へ押し、アルミ箔が破れて錠剤が出てきます。

裏面もお読みください

誤って、そのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。

**〔成分・分量〕** 本品6錠(1日量)中

胎盤加水分解物(G) .....	400mg
胎盤乾燥微粉末 .....	100mg
チアミンジスルフィド .....	10mg
リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> ) .....	6mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> ) .....	6mg
ビタミンE散 .....	60mg
(トコフェロール酢酸エステルとして30mg)	
反鼻末 .....	50mg
胆汁末 .....	50mg
ロクジョウ末 .....	15mg
地黄軟エキス .....	100mg(原生薬として200mg)
トウキエキスS .....	100mg(原生薬として400mg)
オウギエキス .....	100mg(原生薬として2,000mg)

添加物として無水ケイ酸、乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、硬化油を含む。

**〔成分・分量に関連する注意〕**

服用により尿が黄色になることがあります。これはビタミンB<sub>2</sub>が吸収利用され、その一部が尿中に排泄されるためご心配はいりません。

**〔保管及び取扱い上の注意〕**

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)箱に「開封年月日」を記入してください。  
添付文書は、箱に入れたまま保管してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

日々の健康は薬だけではなく、日々の養生が大切な要因となります。規則正しい生活を守るようにしてください。

**お問い合わせ先**

大木製薬株式会社  
電 話：03-3256-5051  
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発 売 元  **大木製薬株式会社**  
東京都千代田区神田鍛冶町3-3

製造販売元 **ビタエックス薬品工業株式会社**  
京都市伏見区竹田向代町7番地