

この説明書は本剤とともに保管し、
服用に際しては必ずお読み下さい。

天然型ビタミンE・ビタミンC・B₂ 配合

トコスタシーエースEC2000

第3類医薬品

■製品の特徴

- 末梢の血液循環を促進させます。
末梢血管の血流を促進し、血行障害による症状（肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ）をやわらげます。
- 体内の過酸化脂質の増加を防ぎます。
ビタミンEは、血管壁や血液中の過酸化脂質（変質した脂肪）の増加を防ぎ、体内脂肪を安定に保ちます。
- 血管壁を強くします。
毛細血管を丈夫にし、歯ぐきからの出血や鼻出血を予防します。
- しみや日やけなどによる色素沈着を防ぎます。
ビタミンCは、しみや日やけなどの色素の沈着を防ぐ働きがあります。
- 効力のすぐれた成分を配合しています。
植物油より抽出、精製、安定化した天然型ビタミンE（酢酸d- α -トコフェロール）は体内での効力がすぐれています。ビタミンB₂ 酪酸エステル（リボフラビン酪酸エステル）は、従来のビタミンB₂（リボフラビン）より体内での持続性にすぐれており、また血中の脂質代謝にも関与しています。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
便秘、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師、又は登録販売者に相談して下さい

■適応症

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：
肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 次の諸症状の緩和：
しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：
歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンE Cの補給：
肉体疲労時、病中病後の体力低下時、老年期

■用法・用量

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
成人（15才以上）	1 包	1～3回
11才以上15才未満	2/3包	
7才以上11才未満	1/2包	
7 才 未 満	服用しないこと。	

ただし、1日2回の場合は朝夕、3回の場合は朝昼晩に服用する。

<用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

■成 分

3包（成人1日量）中、次の有効成分を含有します。

成 分	含 量
酢酸d- α -トコフェロール（天然型ビタミンE）	300mg
アスコルビン酸（ビタミンC）	200mg
リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB ₂ 酪酸エステル）	12mg

添加物として粉末還元麦芽糖水アメ、白糖、デキストリン、エリスリトール、第三リン酸カルシウム、プルラン、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、酒石酸、ビタミンE、香料を含有します。

<成分に関連する注意>

- (1) 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、本剤を服用していることを医師に知らせて下さい。
- (2) 本剤に配合されているリボフラビン酪酸エステルにより、尿が黄色になることがあります。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。なお、使用期限内であっても、なるべく早く服用して下さい。（品質保持のため。）
- (5) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (6) 箱の開封年月日記入欄に、開封日を記入して下さい。

■包装単位

80包（1包2g入り）

■お問い合わせ先

備前化成株式会社 お客様相談窓口
電 話 0120-330-476（フリーダイヤル）
受付時間 9:00～17:00（土日祝祭日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

☎ 0120-149-931

製造販売元



備前化成株式会社

BIZEN 岡山県赤磐市徳富363