

△ 使用上の注意

してはいけないこと ☒

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる]

(1) 小児には服用させないでください。

(2) 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。

関係部位	症	状
消化器	吐き気	嘔吐

他の強心薬

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

3. 5～6日間服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

どうき  
息切れ  
気付け

1回1粒  
1日2回

開封□

第2類医薬品

金粒六神丸

効能又は効果

どうき、息切れ、気付け

成分及び分量 1日量(2粒)64.4mg中

ゴ	オ	ウ	……	4mg	ニンジン末	……	13mg
セ	ン	ソ	……	5mg	牛胆	……	3mg
サ	フ	ラン	……	3mg	沈香末	……	21mg
鹿	茸	末	……	5mg	龍腦	……	3mg

添加物として寒梅粉、金箔、アラビアゴム末を含有します。

用法及び用量

大人(15歳以上)1回 1粒

1日2回 朝夕に水又は白湯にて服用してください。

小児(15歳未満)は、本剤を服用しないでください。

用法及び用量に関連する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) かまずに服用してください。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 服用に際しては、説明文をよく読んでください。
- (4) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

配置品目番号 奈4-503-24

製造販売元

三星製薬株式会社

(お問い合わせ先)

奈良県御所市153番地

電話 0745-65-2130

紙 : 箱  
台紙

ラ : キャップ  
中栓

ガラス : 瓶