

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

鎮咳去痰薬

和漢薬エキス配合

せき・たん・ぜんそく

第②類医薬品

アスゲン散EX[®]

アスゲン散EXは、和漢薬のマオウ・カンゾウのエキスに、ジプロフィリン、無水カフェイン、クロルフェニラミンマレイン酸塩を配合した、せき・たん・ぜんそくの症状を緩和するお薬です。これらの成分の働きにより、かぜや気道粘膜のアレルギー症状に伴う、せき・たんに優れた効果を示します。また、ぜんそく症状に対しても、気管支をひろげ、たんを切れやすくし、胸の重苦しさをとり、呼吸困難を和らげます。

⚠ 〔使用上の注意〕



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

2.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります。）

3.過量服用しないでください



相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3) 高齢者。

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難

(6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、てんかん

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。



相談すること (おもてより続く)

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください：口のかわき、眠気
- 4.5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

せき、たん、ぜんそく

〔用法・用量〕

下記1回量を1日3回、毎食後に服用してください。

年齢	成人 (15歳以上)	11歳以上 15歳未満	7歳以上 11歳未満	3歳以上 7歳未満	3歳未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	服用しないこと

〔用法・用量に関する注意〕

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量〕

淡褐色～茶褐色の散剤で、3包（成人1日服用量：3.0g）中に、次の成分を含有します。


成 分	分 量
マオウ乾燥エキス（原生葉として3.45gに相当）	575mg
カンゾウエキス（原生葉として0.66gに相当）	165mg
無水カフェイン	120mg
ジプロフィリン	150mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8.2mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、アセスルファムK、メタケイ酸アルミン酸Mg、トウモロコシデンプン、乳糖を含有します。

※本剤は、和漢葉エキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります、効果には変わりありません。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返し残量を記載して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申しあげます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3370-7174(代表)

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元 日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

製造販売元 アスケン製薬株式会社

岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008