

使用に際して、この添付文書をお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

泡の速乾性手指消毒剤

ウエルフォーム®

第2類医薬品

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと
手指の皮膚の治療を受けている人。
2. 次の部位には使用しないこと
損傷のある手指、唇等の粘膜の部分、目の周り。(局所刺激作用がある。)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 今までに薬や化粧品によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
(2) 医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
使用後、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合。

● 効能・効果

手指の消毒

● 用法・用量

そのまま手指に塗布又は塗擦

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用すること。

● 成分・分量

本剤100mL中 クロルヘキシジングルコン酸塩 0.2g

及び添加物としてポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、グリチルレチン酸、N-ココイル-L-アルギニンエチルエステルDL-ピロリドンカルボン酸塩、トコフェロール酢酸エステル、エタノール 含有。

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない場所に、密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 本剤はアルコールを含有しているため床にこぼれると変色する場合があるので注意すること。
- (6) 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。

【お問合せ先】

丸石製薬株式会社 学術情報グループ

大阪市鶴見区今津中2-4-2

TEL. 0120-014-561

製造販売元

㊞ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2