

服用に際して、この説明文書を必ず読むこと
必要時に読めるように大切に保管すること

第2類医薬品


胃のもたれ、食べすぎ、胸やけに 新マミオス[®]胃腸薬

生薬配合

〔新マミオス胃腸薬の特徴〕

1. 芳香性健胃生薬シュクシャ末、チョウジ末、ケイヒ末の配合により、胃の働きを良くします
2. 脂肪の消化を助けるリパーゼとデンプンの消化を助けるビオジアスターゼの働きにより、食物の消化を高めます
3. カンゾウ末と制酸剤の働きにより、胃を保護します

〔新マミオス胃腸薬はこんな時に〕



〔使用上の注意〕



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の診断を受けた人
腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
 - (2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください
便秘、下痢

【効能】

もたれ(胃もたれ), 食べすぎ(過食), 飲みすぎ(過飲), 胸やけ, 胃部・腹部膨満感, 消化不良, 消化促進, 食欲不振(食欲減退), 胃弱, 胃酸過多, 胸つかえ, 胃部不快感, 胃重, げっぷ(おくび), はきけ(むかつき, 胃のむかつき, 二日酔・悪酔のむかつき, 嘔気, 悪心), 嘔吐, 胃痛, 胃部膨満感, 消化不良による胃部・腹部膨満感

【用法・用量】

次の量を, 水またはお湯で服用してください

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	3回 (毎食後)
11歳～15歳未満	2/3包	
8歳～11歳未満	1/2包	
5歳～ 8歳未満	1/3包	
3歳～ 5歳未満	1/4包	
3歳未満	服用しないこと	

小児に服用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに服用させていただきます

【成分・分量】

本剤は, 緑色で特異な芳香と清涼味がある顆粒で, 1包(1.5g)中に次の成分を含有する

シュクシャ末	20mg
チョウジ末	35mg
ケイヒ末	80mg
カンゾウ末	100mg
ジオシアスターゼ	100mg
リパーゼ	20mg
炭酸水素ナトリウム	550mg
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	400mg

添加物: トウモロコシデンプン, ヒドロキシプロピルセルロース, 銅クロロフィリンNa, 無水ケイ酸, l-メントール

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり, 品質が変わる)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には, 袋の口を折り返して保管し, 2日以内に服用してください
- (5) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

本品についてのお問い合わせは, お買い求めのお店, または下記にお願い致します

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8

電 話 03(6667)3232

受付時間 9:00～17:00(土, 日, 祝日を除く)

® 登録商標



Daiichi-Sankyo

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋小網町1-8