

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

胃のもたれ、食べすぎ、胸やけに

新マミオス[®]胃腸薬

生薬配合

新マミオス胃腸薬の特徴

1. 芳香性健胃生薬シュクシャ末、チョウジ末、ケイヒ末の配合により、胃のはたらきを良くします。
2. 脂肪の消化を助けるリパーゼとデンプンの消化を助けるビオジアスターゼのはたらきにより、食物の消化を高めます。
3. カンゾウ末と制酸剤のはたらきにより、胃を保護します。

〔新マミオス胃腸薬はこんな時に〕



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。
透析療法を受けている人
2. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 次の診断を受けた人
腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効 能・効 果

もたれ（胃もたれ）、食べすぎ（過食）、飲みすぎ（過飲）、胸やけ、胃部・腹部膨満感、消化不良、消化促進、食欲不振（食欲減退）、胃弱、胃酸過多、胸つかえ、胃部不快感、胃重、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、胃痛、胃部膨満感、消化不良による胃部・腹部膨満感

用 法・用 量

次の量を、水又はお湯で服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数
15 歳 以 上	1 包	3回 (毎食後)
11歳以上15歳未満	2/3 包	
8 歳以上11歳未満	1/2 包	
5 歳以上 8 歳未満	1/3 包	
3 歳以上 5 歳未満	1/4 包	
3 歳 未 満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守して下さい。
- (2)3歳以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成 分・分 量

本剤は、緑色で特異な芳香と清涼味がある顆粒で、3包（1包1.5g）中に次の成分を含有しています。

シュクシャ末・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60mg
チョウジ末・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105mg
ケイヒ末・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・240mg
カンゾウ末・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300mg
ビオジアスターゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300mg
リパーゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60mg
炭酸水素ナトリウム・・・・・・・・・・・・・・・・・・1650mg
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム・・・・・・・・1200mg
添加物：トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、銅クロロフィリンNa、無水ケイ酸、L-メントール

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤に配合されている銅クロロフィリンナトリウムにより、便が緑色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電 話 03(5205)8331
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

®登録商標



製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋3-14-10