



せき、たんに

プレコール®持続性せき止めカプセル

1日2回、持続性のせき止め薬

プレコール持続性せき止めカプセルの特徴

- 朝・夜の1日2回だけの服用で優れた効果を発揮する持続性カプセルです。
- 鎮咳成分デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物がせきをしずめます。
- 4つの成分がつらいせき、たんに効果を発揮します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、鎮静薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい(眠気があらわれることがあります)。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 授乳中の人

(4) 高齢者

(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人

(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(7) 次の症状のある人：高熱、排尿困難

(8) 次の診断を受けた人：心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

□のかわき

効 能・効 果

せき、たん

用 法・用 量

次の量を、水又はお湯で服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1カプセル	2回 (朝・夕)
15歳未満	服用しないで下さい。	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守して下さい。

(2)カプセルの取り出し方

図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)。



成 分・分 量

本剤は、淡紫色と白色のカプセルで、2カプセル(1日量)中に次の成分を含有します。

成 分	分 量	はたらき
デキストロメトルフアン 臭化水素酸塩水和物	60mg	せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	せきをしずめ、たんを出しやすくします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8mg	アレルギー性のせきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	135mg	たんをきれやすくします。

添加物：乳糖、セルロース、CMC-Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、ゼラチン、赤色3号、青色1号、ラウリル硫酸Na

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。
- (4)表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
電 話 03(6667)3232
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

® 登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋小網町1-8

製造販売元
佐藤薬品工業株式会社
奈良県橿原市観音寺町9-2