

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鼻炎用内服薬

第②類医薬品

小児用チルダン鼻炎シロップS

小児用チルダン鼻炎シロップSは、鼻水、鼻づまりの症状を緩和するカンゾウを配合した小児用の鼻炎シロップです。

特 長

- ノンカフェインでお子さまの眠りをさまたげません。
- 3種類の成分が働いて、鼻水、鼻づまりの症状をやわらげます。
- お子さまが簡単に開けられない、安全キャップを採用しています。
- 甘くて飲みやすい、いちごミルク味のシロップ剤です。

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、鼻炎用内服薬として定められた一般的な注意事項を記載しております。

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）。
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい
(眠気があらわれることがあります。)
3. 長期連用しないで下さい

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人。
緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
その他	排尿困難

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい
口のかわき。

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻水（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

用法・用量

1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用して下さい。場合により1日6回まで服用して差し支えありませんが、原則として4時間の間隔をおいて服用して下さい。

年 齢	1 回量	備 考
3 才以上 7 才未満	10.0mL	添付の計量コップを用い、 年齢に応じて、左記の分 量を計って下さい。
1 才以上 3 才未満	7.5mL	
6 ヶ月以上 1 才未満	6.0mL	
3 ヶ月以上 6 ヶ月未満	5.0mL	
3 ヶ月未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 定められた用法、用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。

成分・分量

成 分	1 日量 (60mL) 中	働 き
クロルフェニラミンマレイン酸塩	4mg	鼻水、鼻づまりの緩和
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg	せき、たんどの緩和
カンパウエキス(カンパウとして200mg)	50mg	鼻水、鼻づまりの緩和

添加物として果糖、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料、白糖、カラメルを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) ビンの口、計量コップは常に清潔にして下さい。
- (5) 使用期限はケース底面及びビンラベルに記載されています。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用して下さい。
- (7) 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用して下さい。

安全キャップの使用方法は、ケース側面及びビンラベルに記載してあります。

キャップが開けにくい場合は、キャップ部分をお湯(50～60℃)に2～3分つけると開けやすくなります。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

消費者相談窓口

日新製薬株式会社

TEL 0120-967-862

FAX 0748-62-3417

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

製造販売元

日新製薬株式会社

〒528-0013 滋賀県甲賀市水口町宮の前2-62