

常盤薬品
NOEVIR GROUP

指定医薬部外品

プロテクトドロップ

リンゴ
風味

常盤薬品
NOEVIR GROUP

プロテクトドロップ

のど飴で殺菌バリア

指定医薬部外品

口腔内の
殺菌・消毒、
のどの不快感に



殺菌成分CPC

6mg配合(1日量6錠中)

24錠入
(4錠×6包)

押してあげる

リンゴ
風味
シュガーレス

プロテクトドロップ

指定医薬部外品
リンゴ風味

のど飴で殺菌バリア

プロテクトドロップ

指定医薬部外品

のど飴で殺菌バリア

トキワ薬用のど飴A(口腔咽喉薬)

使用に際しては、この説明文を必ずお読みください。
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

使用上の注意(相談すること) 1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(1)医師または歯科医師の治療を受けている人。(2)本人または家族がアレルギー体質の人。(3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(1)使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状	(2)5~6日周使用しても症状がよくなる場合。
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	

効能・効果 口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ、のどのあれ・のどの不快感、のどの痛み、のどのほれ
用法・用量 成人(15才以上)1回1錠を1日6回、5才以上15才未満1回1錠を1日3回、いずれも1錠ずつ口中にきみ、かまずにゆっくり溶かしてください。なお、1回分を使用後は、2時間以上の間隔をおいて使用してください。＜用法・用量に関連する注意＞(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)かみ砕いたり、飲み込んだりしないでください。**成分・分量** 1日量(6錠)中 セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)6mg 添加物:イソマル、グリセリン脂肪酸エステル、アセサルファムK、クエン酸、L-メントール、香料(プロピレングリコール、フェニルエチルアルコール) **保管および取扱上の注意** (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になり、品質が変わります。)(4)期限を過ぎた製品は使用しないでください。(5)分割して残った薬は、袋の口を折り曲げて保管し、すみやかに使用するが、廃棄してください。

常盤薬品工業株式会社
NOEVIR GROUP

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1

製造販売元 三重県伊賀市白檜字永谷260-5

お問い合わせは
常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室 0120-875-710まで
www.tokiwayakuhin.co.jp

1錠あたり3kcal
24錠(4錠×6包)
指定医薬部外品

067940
TISB102

使用期限

製造

