

**すっきり
服用感**

【飲みやすい錠剤タイプ】
**空腹時の胃の痛みにも
効く!**

パンシロン[®]

胃腸薬

キュア S 錠

ストレスや 食べ過ぎによる

- ☑ 胃の痛み
- ☑ 胃の不快感
- ☑ 出すぎた胃酸

速効性と持続性の制酸剤配合



第2類医薬品

ロート製薬

お客様安心サポートデスク

お気軽にご相談ください。

東京:03-5442-6020

大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00

(土、日、祝日を除く)



パウチでエコ

切り取り線

吸湿しないように、服用のつどチャックをしっかりしめること **胃腸薬**

【効能・効果】胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)、胃痛

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (2) 透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと：胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと (目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある) 4. 長期連用しないこと

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 授乳中の人 (3) 高齢者 (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 次の症状のある人：排尿困難
(7) 次の診断を受けた人：緑内障、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師又は薬剤師に相談すること。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はきけ、胃部膨満感
その他	排尿困難、動悸、目のかすみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様 症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる

(2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること：便秘、下痢、口のかわき

【用法・用量】 次の量を1日3回食前または食間の空腹時に、水又はお湯で服用すること。

15才以上…1回2錠、15才未満…服用しないこと ※食間とは、食後2～3時間を指す。＜用法・用量に関連する注意＞用法・用量を厳守すること。【成分・分量】(6錠中)水酸化マグネシウム 450mg、合成ヒドロタルサイト 780mg、沈降炭酸カルシウム 900mg、ホップ乾燥エキス-Q 33.2mg(ホップとして471.5mg)、アルジオキサ 150mg、ピレンゼピン塩酸塩水和物 46.9mg、添加物として、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、クロスカルメロースナトリウム、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、ℓ-メントール、香料を含む。【保管及び取扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。(5) まれに錠剤に黒い点がみられるが品質には問題ない。

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

ロート製薬株式会社 大阪市生野区箕西1-8-1

お客様安心サポートデスク：06-6758-1230