

この添付文書は、本剤のご使用前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

かゆい湿疹・皮膚炎に エンクロン ローションEX

体内で低活性になるステロイド系治療薬

特 長

- 吉草酸酢酸プレドニゾロンは、アンテドラッグのステロイド剤で、湿疹、皮膚炎等の炎症を鎮めます。

「アンテドラッグとは」

- 皮膚表面の患部で効果を発揮したのち、体内に吸収されると低活性となる性質を持つ薬剤の総称です。

- 抗ヒスタミン剤であるジフェンヒドラミン塩酸塩と鎮痒剤クロタミトンが、湿疹、かぶれ等に伴うかゆみを抑えます。

- トコフェロール酢酸エステルが血行を促進し、治療を助けます。

- 殺菌剤イソプロピルメチルフェノールが患部の感染を防ぎ、症状の悪化を防ぎます。

- 頭髮部位や広い患部にも塗りやすい、のびのよい乳液タイプです。

こんな症状にお使ください

かゆみ 湿疹 皮膚炎 かぶれ あせも じんましん 虫さされ



● かゆみ



● 湿疹



● かぶれ



● 皮膚炎

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
 - (2) 目の周囲、粘膜(例えば、口唇等)
2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 患部が広範囲の人
 - (5) 湿潤やただれのひどい人
 - (6) 妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮ふ(患部)	みずむし・たむし等の白癬症、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- (2) 5～6日間使用しても症状が良くならない場合

【適応症】 皮膚炎、かゆみ、湿疹、かぶれ、あせも、じんましん、虫さされ

【用法・用量】 1日数回、適量を患部に塗擦してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 使用前によく振とうしてください。
- (6) 本剤を塗布後、患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

【成分と作用】

成 分	分量(1g中)	作 用
吉草酸酢酸プレドニゾロン	1.5mg	湿疹、皮膚炎等の炎症を抑えます。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	20mg	湿疹、かぶれ等に伴うかゆみを抑えます。
クロタミトン	50mg	
トコフェロール酢酸エステル	5mg	血行を促進し、治療を助けます。
イソプロピルメチルフェノール	1mg	患部の感染を防ぎ、症状の悪化を防ぎます。

添加物として以下の成分を含有します。

白色ワセリン、流動パラフィン、メチルポリシロキサン、ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、1,3-ブチレングリコール、グリセリン、ヒドロキシエチルセルロース、エデト酸Na水和物、l-メントール、フェノキシエタノール

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【お問い合わせ先】 資生堂薬品株式会社 お客様窓口
電 話 03-3573-6673
受付時間 9:30～17:00(土、日、祝日を除く)

SHISEIDO

発売元 資生堂薬品株式会社 東京都中央区銀座7-5-5
製造販売元 岩城製薬株式会社 東京都中央区日本橋本町4-8-2