

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう保管してください。

第②類医薬品

日本薬局方 ブテナフィン塩酸塩クリーム

# ラティノXAクリーム

## 水虫・たむし治療薬

**ブテナフィン塩酸塩配合**

**ラティノXAクリーム**は水虫のつらい諸症状を鎮めながら、水虫の原因である白癬菌を殺菌する水虫薬です。白癬菌に優れた殺菌力を持つブテナフィン塩酸塩を1%配合。角質層によく浸透し、1日1回の使用でよく効き、不快な症状を改善します。



使用上の注意

**してはいけないこと**



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

**1. 次の人は使用しないでください**

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

**2. 次の部位には使用しないでください**

- (1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。

**相談すること**



**1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 乳幼児。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 患部が顔面又は広範囲の人。
- (6) 患部が化膿している人。
- (7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜいたむし」かがはっきりしない人。  
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

**2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

| 関係部位 | 症状                                |
|------|-----------------------------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただれ、水疱、亀裂 |

**3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

## 【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

## 【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください。

### ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

## 【成分・分量】 100g中

| 成 分         | は た ら き            | 分 量  |
|-------------|--------------------|------|
| 日局ブテナフィン塩酸塩 | 角質層へ浸透し、白癬菌を殺菌します。 | 1.0g |

添加物としてグリセリン脂肪酸エステル、モノステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、カルボキシビニルポリマー、セタノール、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレングリコール、*l*-メントール、pH調節剤を含有します。

## 水虫治療のポイント

### ①根気よく継続治療をする

かゆみがなくなっても、すっかり治るまで根気よく治療を続け再発を防ぎましょう。

### ②患部を乾燥させる

通気性の悪い靴下やブーツ、ゴム長靴は好ましくありません。むれを防ぎ、乾燥に心がけましょう。

### ③衣類も清潔にする

靴や靴下、スリッパ、浴室のマットも清潔に保ち感染に注意しましょう。

### ④患部をよく洗って清潔にする

白癬菌の増殖や二次感染を防ぐため、患部をよく洗い、乾燥させて清潔に保ちましょう。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるのを防ぐため。)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。(品質保持のため。)
- (5) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (6) チューブの口穴を開ける際にチューブを強く握り過ぎるとクリームが多く出る場合がありますのでご注意ください。

このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎ (06) 6351-2100 (代表) 受付時間 9:00～17:00(土日祝日を除く)



KUDA 奥田製薬株式会社

大阪市北区天満 1 丁目 4 番 5 号

<http://www.okudaseiyaku.co.jp>