

第3類医薬品

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

ビタミンC
主薬製剤

ビタミンC、ビタミンB₂、ビタミンB₆、パントテン酸カルシウム 配合

インナーホワイト

特徴

インナーホワイトは、アスコルビン酸(ビタミンC)にリボフラビン(ビタミンB₂)、パントテン酸カルシウム、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)を配合した黄色の顆粒剤で、乳幼児(1才以上)からご年配の方まで服用して頂けます。

△ 使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるため、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

○次の諸症状の緩和:しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

○次の場合の出血予防:歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」

○次の場合のビタミンCの補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

【用法・用量】

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	2回
7才以上15才未満	2/3包	
1才以上7才未満	1/2包	
1才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(裏面につづく)

【成分・分量】 1日量(2包)中

アスコルビン酸散	506mg	・お肌の内側からシミ・そばかす・日やけの原因となるメラニン生成を抑制します。 ・コラーゲンの生成に関与します。 ・皮膚のやわらかさやしなやかさを保ちます。
アスコルビン酸(ビタミンC)として	500mg	
パントテン酸カルシウム	10mg	・皮膚を正常に維持して肌荒れを緩和します。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	10mg	・お肌の代謝を正常化し、本来のキレイなお肌への生まれ変わりを促進します。
リボフラビン(ビタミンB ₂)	2mg	

添加物として白糖、D-マンニトール、ポビドン、乳糖水和物、無水ケイ酸、エチルセルロース、香料を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1)本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、医師の治療を受ける場合は、アスコルビン酸(ビタミンC)を含有する製剤を服用していることを医師にお知らせください。
- (2)本剤の服用により、尿が黄色くなるがありますが、リボフラビン(ビタミンB₂)を含有するためですからご心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

【お問い合わせ先】

本剤のご使用により、変わった症状があらわれる等、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

株式会社東洋新薬 お客様相談室 電話 0120-567132
受付時間 9:30~17:00(土・日・祝日を除く)

■発売元 株式会社東洋新薬
佐賀県鳥栖市弥生が丘7-28

■製造販売元 牛津製薬株式会社
佐賀県小城市牛津町下砥川1-2