

レンズ装用中の目の疲れをほぐす。

ロート【アイストレッチ】コンタクト


目の疲れ・レンズ装用中の不快感に 12mL

ソフト
コンタクト
したまま

レンズ装用中の
コリかたまつた
目の筋肉に。

近くを見たり遠くを見る時、ピント調節筋と呼ばれる筋肉が使われます。筋肉の一種ですから、疲れてくればコリかたまつります。そんなつらい目の疲れには、この目薬。コリかたまつたピント調節筋の疲れをほぐすネオスチグミンメチル硫酸塩と、潤いを保ち、角膜を守るコンドロイチン硫酸エステルナトリウムを配合。

レンズ装用中の目の
つらい疲れにも
「ロートアイストレッヂ
コンタクト」。

ソフト ハード O₂ 使い捨て

コンタクトレンズ装用中の不快感、
目の疲れに効く目薬です。
もちろんレンズをはずした後にも
ご使用いただけます。

(カラーコンタクトレンズ装用中には使用しないでください。)

目薬には、ソフトコンタクトレンズ装用中に
使用できるものと使用できないものがあります。

ソフトコンタクトレンズを装用したまま目薬を使用する場合は、外箱や添付文書を確認し、
必ず、ソフトコンタクトレンズ装用中に使用できる目薬を使用しましょう。

解眼新書

18世紀に、日本の医学の振興を目指して翻訳された“解体新書”。その開拓の思想のもとに、ロートは現代人の目の疾患をあらゆる方向から見つめ直しています。現在までに培ってきたノウハウと最新技術で酷使される目に応えたい、その想いを「解眼新書」の文字に託しました。

解眼新書ホームページ <http://www.rohto.co.jp/kaigan/index.htm>

いつでも、どこでも、簡単にさせる!

目が疲れた時、簡単にアイケアできて、
とても便利です。



フリーアングルノズル®

キャップの開閉方法

キャップの開け方
キャップを手前に
ひねってください。



キャップの閉め方
カチッと音がするまで
押し下げてください。



*容器全体を支えるように持ち、キャップを上にして開閉してください。容器の中央部分だけを持って開閉すると、薬液がとびだしてもれことがあります。

使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
　　はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人
　　緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使

用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

目の疲れ、ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)

用法・用量

1回1~2滴、1日5~6回点眼してください。

用法・用量に関する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。
- (4) コンタクトレンズを装着していないときも使用できます。



容器の先と
目やまつ毛が
ふれることのないように

成 分

ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.5%
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.01%
ピリドキシン塩酸塩	0.01%
添加物:ホウ酸、ホウ砂、l-メントール、d-カンフル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンポリオキシプロピングリコール、エデト酸Na、等張化剤、pH調節剤	
※防腐剤(ベンザルコニウム塩化物、パラベン)を配合していません。	

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40°C以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、保管及び取扱い上の注意に従い、2~3ヶ月を目安にご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとてご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

401137702