

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

水虫・たむし治療薬 プテナフィン塩酸塩配合

第②類医薬品

# プテナロックV $\alpha$ エアー<sup>®</sup>

『かゆみ止め成分+冷却力』のW効果でかゆみを抑えます!!

患部にピンポイントで噴射できる「ジェット式」なので、直接手を触れることなく簡単・清潔に使用できます。

## ▲使用上の注意

### ❌してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。〕

#### 1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

#### 2. 次の部位には使用しないでください。

- (1)目や目の周囲、顔面、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。  
(2)湿疹。(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



### ■相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)乳幼児。(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(5)患部が広範囲の人。(6)患部が化膿している人。(7)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

#### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑、ただれ、水疱、乾燥感、ヒリヒリ感、亀裂

#### 3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

## 効能・効果

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし


## 用法・用量

1日1回、適量を患部に噴射塗布してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。(2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。(3)小児に使用させる場

合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(4)外用にのみ使用してください。(5)患部より約10cmの距離で噴射してください。(6)同じ箇所に連続して3秒以上噴射しないでください。(7)患部に対して容器を下に向けて使用してください。(上向き、横向きでの使用は噴射剤のみが出て、薬液が残り、最後まで使用できなくなります。)



## 成分・分量

原液 1mL中	ブテナフィン塩酸塩	10mg	ℓ-メントール	20mg
	ジブカイン塩酸塩	2mg	クロタミトン	10mg
	クロルフェニラミンマレイン酸塩	5mg	イソプロピルメチルフェノール	3mg
	グリチルレチン酸	2mg		

添加物として、エタノール、ジエタノールアミン、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、LPGを含有します。

### 〈成分に関連する注意〉

アルコールを含んでいますので、塗布時にしみる場合があります。

## 保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所にキャップを閉めて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4)使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。(5)火気に近づけたり、火の中に入れてたりしないでください。また、使用済みの容器は火中に投げないでください。(6)合成樹脂(スチロール等)を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがありますので、バッグや床、家具などにつかないようにしてください。(7)火花が出る所で使用しないでください。

## ガス抜きキャップの注意事項と方法 / 分別廃棄の仕方

※下図は商品の説明書です。サンプル品は構造が異なります。

①[PUSH]マークを上押し上げるように押してください。

②押しボタンを引き抜きます。

③キャップの上部をはずし、平らな所に図の様に置きます。

④本体を逆さまにし、噴射口をキャップの受け口に合わせ置いて置きます。

⑤本体を「カチッ」と音がするまで押し込み、噴射音が消えるまで放置します。



⑥噴射音が完全に消えてから、市町村等で定められた方法により破棄してください。

※必ず中身を使い切ってから、火気のない屋外でガス抜きを行ってください。  
 ※ガス抜き中は、わずかに残った薬液がガスと共に噴き出しますので、顔を近づけないでください。  
 ※本品のキャップ以外使用しないでください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  久光製薬株式会社 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

お客様相談室： ☎ 0120-133250

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
 (独)医薬品医療機器総合機構 ☎ 0120-149-931

