

カコル持続性鼻炎カプセル

製品の特徴

カコル持続性鼻炎カプセルは花粉・ほこりによるアレルギー性鼻炎や、かぜによる急性鼻炎に効果を発揮します。塩酸プソイドエフェドリンとリゾチーム塩酸塩で鼻づまりを緩和し、クロルフェニラミンマレイン酸塩でくしゃみや鼻水をおさえます。

速放性と徐放性の顆粒が混合された処方です。服用後速やかに効果を発揮し、1日2回の服用で効き目が持続します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人には服用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(2)次の症状のある人
前立腺肥大による排尿困難
(3)次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある)
4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)高齢者
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5)次の症状のある人
高熱、排尿困難
(6)次の診断を受けた人
緑内障
(7)モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(裏面もお読みください)

〔効能・効果〕

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

〔用法・用量〕

1日2回朝夕に服用してください。

年 令	大人（15才以上）	7才以上15才未満	7才未満
1回量	 2 カプセル	 1 カプセル	服用しないでください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります）



〔成分・分量〕（4カプセル中：大人1日量）

成 分	分量	は た ら き
塩酸ブソイドエフェドリン	120mg	末梢血管収縮作用により、鼻粘膜の充血やはれをおさえ、鼻づまりを緩和します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	8mg	抗アレルギー作用により、くしゃみ、鼻水をおさえます。
無水カフェイン	100mg	鼻炎にともなう頭重を和らげます。
リゾチーム塩酸塩	60mg (力価)	鼻炎による腫脹（ハレ）をしずめ、鼻づまりを緩和します。
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg	鼻汁の分泌を抑制し、鼻水、なみだ目をおさえます。

添加物として、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、部分アルファー化デンプン、青色1号、ラウリル硫酸Na及びゼラチンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

株 式 会 社 阪 本 漢 法 製 薬 【 お 客 様 相 談 室 】
〒530-0057 大阪市北区曽根崎2丁目7番4号 電話：(06)6131-1300
受付時間：祝祭日を除く 月～金曜日 10：00～17：00
ホームページ：http://www.sakampow.com

発売元



株式会社 阪本漢法製薬

大阪市北区曽根崎2丁目7番4号

製 造
販売元

共栄製薬工業株式会社
富 山 県 高 岡 市 中 田 4 5 7 6 番 地