

しみ・そばかす・日やけなどによる色素沈着の緩和に

第3類医薬品

ビタミンC主薬製剤（L-システイン配合）

シナール[®] イクシ

 シオノギ製薬

しみ、そばかす、日やけなどによる色素沈着は、加齢や紫外線などの影響で、メラニンが過剰に増えることによっておこります。

シナール イクシは、メラニンの生成を抑えるビタミンC1000mg（成人1日量）と、肌細胞の新陳代謝に関わるL-システインに加え、肌の正常な働きを助けるパントテン酸カルシウムを配合し、しみ、そばかす、日やけなどによる色素沈着を緩和します。またノンシュガーで、カロリーは1錠あたり約1kcalです。



使用上の注意……



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師または薬剤師にご相談下さい

（1）服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消化器	悪心・嘔吐、腹痛

（2）1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談下さい
下痢

……効能・効果……

○次の諸症状の緩和

しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

○次の場合の出血予防

歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師または歯科医師にご相談下さい。」

○次の場合のビタミンCの補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

……用法・用量……

次の量を食前または食後におのみ下さい。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15才以上）	2 錠	3 回
小児（7才以上 15才未満）	1 錠	
乳幼児（7才未満）	服用させないこと	

●定められた用法・用量を厳守して下さい。

●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

……成分・分量……

シナール イクシは、白色のフィルムコーティング錠で、6錠（成人1日量）中に次の成分を含有しています。


成 分	含量(6錠中)
アスコルビン酸（ビタミンC）	1000mg
L-システイン	240mg
パントテン酸カルシウム	24mg

添加物として乳酸カルシウム水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、結晶セルロース、ヒプロメロース、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、酸化チタン、タルク、マクロゴール6000、グリセリン、カラメル、カルナウバロウを含有しています。

●本剤の服用により、尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせ下さい。

……保管および取扱い上の注意……

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に密栓して保管して下さい。(ビンのフタの閉め方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用のつどフタをよく閉めて下さい)
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防ぐためのものですから、ご使用のはじめに必ず捨てて下さい。
- (5) ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないで下さい。
- (6) 水分が錠剤に付くと、表面のコーティングの一部が溶けることがありますので、誤って水滴をおとしたり、ぬれた手で触れないようにして下さい。
- (7) 箱の「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入して下さい。
- (8) 一度開封した後は、品質保持の点から、6ヵ月以内にご使用下さい。
- (9) 使用期限をすぎた製品は、服用しないで下さい。



……お問い合わせ先……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。
塩野義製薬株式会社「**医薬情報センター**」
電話：大阪 06-6209-6948、東京 03-3406-8450
受付時間：9時～17時（土、日、祝日を除く）

「副作用被害救済制度」について
（独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

®:登録商標

販売元

塩野義製薬株式会社

大阪府中央区道修町3丁目1番8号

製造販売元

大峰堂薬品工業株式会社

奈良県大和高田市根成柿574