

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。<目薬>
ロートCキューブクール

第3類医薬品



ロートCキューブ® クール

コンタクトの瞳、クールに
みずみずしくうるおす。

特 長

- ◆ すべてのコンタクトレンズを装着したまま使用できます。
また、コンタクトレンズをはずした後にもご使用いただけます。

ソフト

ハード

O₂

使い捨て

- ◆ ミネラル成分配合で乾いた瞳にうるおいを補給します。
- ◆ 瞳にうるおいをとどめるヒプロメロース配合で、目の乾きや疲れに効果的です。
- ◆ レンズにうるおいベール®を作るポロクサマー(溶解補助剤)配合
- ◆ ヒアルロン酸Na(製剤の粘稠剤)配合
- ◆ フリーアングルノズル®採用で
自由な角度で点眼できます。



キャップの開閉方法

容器全体を支えるように持ち、キャップを上にして開閉してください。
容器の中央部分だけを持って開閉すると薬液がとびだしてもらえることがあります。


キャップの開け方

キャップを手前に
ひねってください。



キャップの閉め方

カチッと音がするまで
押し下げてください。



△ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人: はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人: 緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 目のかすみが改善されない場合
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

用法・用量

1回1～2滴、1日5～6回点眼してください。

— 用法・用量に関連する注意 —

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
[汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因となる]また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。
- (4) コンタクトレンズを装着していないときも使用できます。



効能・効果

ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

成分

塩化カリウム(ミネラル成分)	0.08%
塩化ナトリウム(ミネラル成分)	0.44%
塩化カルシウム水和物(ミネラル成分)	0.005%
ヒプロメロース	0.08%

添加物: ホウ酸、ホウ砂、ヒアルロン酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(ポロクサマー)、エデト酸Na、*l*-メントール、pH調節剤、塩酸ポリヘキサニド

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (7) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京: 03-5442-6020 大阪: 06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00 (土、日、祝日を除く)

ROHTO

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

401194802