

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第2類医薬品

八味地黄丸錠「創至聖」

漢方製剤



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
そ の 他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少または多尿でときに口渴がある次の諸症：
下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ

【用法・用量】

次の量を食前または食間に水又は白湯で服用する。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	4錠	3回
7才以上15才未満	3錠	
7才未満	服用しないこと	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後

〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。


【成分・分量】 1日量（12錠）中

成 分 名	分 量	成 分 名	分 量
ジオウ末	800mg	サンシュユ末	400mg
サンヤク末	400mg	タクシヤ末	400mg
ブクリヨウ末	400mg	ボタンピ末	400mg
ケイヒ末	133mg	加工ブシ末	67mg

添加物：メタケイ酸アルミン酸Mg、カルボキシメチルスターCHNa、ショ糖脂肪酸エステル、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）を含有

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(瓶入の製品は密栓して保管すること。)
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になつたり品質が変わる。)



製品についてのお問い合わせは、下記までお願いします。

株式会社メディカルリーチ 神奈川県川崎市幸区南幸町3-1-2 ニチエーイン川崎25 2階

消費者相談窓口

電話：0120-556-436 受付時間／10:00～18:00 (土・日・祝を除く)

発売元

株式会社メディカルリーチ
神奈川県川崎市幸区南幸町3-1-2
ニチエーイン川崎25 2階

製造販売元

北日本製薬株式会社
富山県中新川郡上市町若杉55