

セイヨウトチノキ種子エキス配合

# デナンコーソフト

第2類医薬品

注入軟膏

痔疾用薬

抗炎症作用のあるセイヨウトチノキ種子エキスを始め、有効成分を軟膏状にして、使いやすい注入式容器に入れた痔疾用薬です。

## 痛み

局所麻酔作用のある  
リドカインで痛み・  
かゆみを鎮めます。

## 血行改善

トコフェロール酢酸エステル  
で血行をよくし、酸化  
亜鉛で患部を保護します。

## はれ

抗炎症作用のあるセイ  
ヨウトチノキ種子エキ  
スで、はれを抑えます。

- ご使用の前に入浴又はぬるま湯を用い、ガーゼなどで患部をきれいにしますと、一層効果的です。
- 排便時の痛みが激しい時は、1時間ほど前に注入しておきますと、排便時の痛みをやわらげ、便の通りをよくします。

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位  | 症 状          |
|-------|--------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
| そ の 他 | 刺 激 感        |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称              | 症 状                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、<br>のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |

3. 10日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って  
医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

## 効能・効果

塗布の場合：きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみはれ・出血・ただれの緩和  
 注入の場合：きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみはれ・出血の緩和

## 包装

10個入、20個入（1個ずつシール包装）

## 用法・用量

適量を取り肛門部に塗布するか、又は15歳以上1回1個を肛門部に挿入し、全量を注入する。1日3回まで使用できます。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないこと。

### （用法及び用量に関する注意）

- (1) 小児には使用させないでください。
- (2) 肛門部にのみ使用してください。

## 成分・分量と作用

| 成分                                              | 1個(2.5g)中        | 主な働き               |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| セイヨウトチノキ種子エキス                                   | 9.375mg(原生薬75mg) | 炎症、はれをおさえます。       |
| リドカイン                                           | 60.0mg           | 局所の痛み、かゆみをしずめます。   |
| トコフェロール酢酸エステル                                   | 50.0mg           | 血行を改善し、うっ血を防ぎます。   |
| アラントイン                                          | 20.0mg           | 傷の修復作用があり、治りを早めます。 |
| 酸化亜鉛                                            | 250.0mg          | 収れん作用があり、患部を保護します。 |
| 添加物として、サラシミツロウ、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ワセリンを含有します。 |                  |                    |

## 養生訓

1. 毎日入浴する。(患部の清潔と血行の改善)
2. 野菜、海藻等繊維の多い食事にする。(便の量を増やし便をやわらかくし、便通を改善)
3. 香辛料は控えめにする。(排便時に患部を刺激する)
4. 深酒をつつむ。(肛門に負担をかけ、患部のうっ血をまねく)
5. トイレは3分以内にすませ、あと必ず清拭する。

### （保管及び取り扱い上の注意）

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

## 使用方法及び治療のポイント

|                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>① キャップを静かにはずしてください。</p>  | <p>② すべりをよくするため薬剤を少量出して先端部に塗ってください。</p>  | <p>③ 肛門に深く挿入し、容器内の薬剤が十分に注入されるように強く押し出してください。<br/>内部に注入する場合</p>  <p>なるべく深く挿入して下さい。</p> | <p>④ 適量を直接患部に塗るか、ガーゼなどにのばして患部にあててください。<br/>外部に塗布して使用する場合</p>  <p>ガーゼ</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

● 注入式のため、容器の中に少量残りますが、残量を見込んで薬剤は十分充填しており、必要量は、肛門内に注入されます。又、寒い時期、容器が多少硬くなりますが、手の中で暖めると出やすくなります。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

ムネ製薬株式会社 〒656-1501 兵庫県淡路市尾崎 859

消費者相談窓口 電話 0120-85-0107

製造販売元 株式会社 雪の元 本店  
 奈良県橿原市大谷町182番地

1101-ZZZ

発売元  ムネ製薬株式会社  
 兵庫県淡路市尾崎 859

970079-A