

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

みずむし・たむし治療薬

オントールEX[®]

特徴

- テルビナフィン塩酸塩の優れた殺真菌作用と角質浸透性により、1日1回の塗布でみずむし・たむしに効果を発揮します。
- リドカイン、クロタミトンが患部のかゆみを鎮めます。
- イソプロピルメチルフェノールが雑菌の繁殖を抑えます。
- グリチルレチン酸が患部の炎症を抑えます。
- 1-メントールが清涼感を与え、患部のかゆみを緩和します。

⚠ 使用上の注意

 してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 次の人は使用しないでください。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膣等）、陰のう、外陰部等。
(2) 湿疹。
(3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 乳幼児。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 患部が顔面又は広範囲の人。
(6) 患部が化膿している人。
(7) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。
（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。）
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、 鱗屑・落屑（フケ、アカのような皮膚のはがれ）、た だれ、乾燥・つっぱり感、ヒリヒリ感、皮膚の亀裂

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

（必ず裏面もお読みください）

【効能・効果】

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】

1日1回、適量を患部に塗布してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)外用にのみ使用してください。
- (6)本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。

〔ブッシュ式液体容器の使用法〕

・容器を下向きにして、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。

【成分・分量】（1g中）

成分	分量	作用等
テルビナフィン塩酸塩	10mg	みずむし・たむしの原因である白癬菌を殺菌します。
リドカイン	20mg	局所麻酔作用により、患部のかゆみを鎮めます。
クロタミトン	50mg	患部のかゆみを鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	3mg	雑菌の繁殖を抑えます。
グリチルレチン酸	5mg	患部の炎症を抑えます。
1-メントール	20mg	清涼感を与え、患部のかゆみを緩和します。

添加物：マクロゴール、水酸化ナトリウム、リン酸、ハアセチルしょ糖、エタノール

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して立てて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4)使用期限（外箱記載）を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5)火気に近づけないでください。
- (6)使用済み容器は火中に投じないでください。
- (7)アルコール類、油脂類等で変質・変色のおそれのあるもの（化学繊維、合成樹脂、家具、床等）への付着は避けてください。

みずむし治療のポイント

1. **清潔** 患部も衣類（靴下）もこまめに洗い清潔に。
2. **乾燥** 靴を脱ぐ、靴下も脱ぐ、風通しよく、よく乾燥。
3. **根気** 風呂あがりの薬剤治療、かゆくなくても1シーズン。

お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願い申し上げます。
新生薬品株式会社 消費者相談窓口 電話番号 076-472-0361
〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1
受付時間 9時～17時（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元 **新生薬品株式会社**

富山県中新川郡上市町横越16番1

SN0