

服用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。



第②類医薬品

イ ス ク ラ ま きょう し が い か りゅう

イスクラ麻杏止咳顆粒S

(生薬製剤)

■特徴

「イスクラ麻杏止咳顆粒S」は、麻杏甘石湯にキキョウ、タルク、チンピを加えた処方で植物・鉱物など7種類の生薬が配合されております。これらの原料を製剤化したもので気管支炎、気管支喘息の改善を目的としております。

⚠ 使用上の注意



■ 相談すること

- 次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 胃腸の弱い人
 - 高齢者
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）で軟便下痢になりやすい人
 - 発汗傾向の著しい人
 - 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
 - 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

- 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

- 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談して下さい。

※裏面もお読み下さい。

■効能・効果

気管支炎、気管支喘息

■用法・用量

次の量を1日3回、食前又は食間に服用して下さい。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満	服用しないで下さい。	

●服用に際しての注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 本剤は、15歳未満の小児には服用させないで下さい。

■成分・分量

本品1日量3包(7.5g)中、下記成分及び分量の生薬より製した麻杏止咳軟エキスS12.5gを含有します。

キキョウ	6.6g
キョウニン	4.5g
カンゾウ	3.6g
セッコウ	3.6g
チンピ	3.6g
タルク	3.3g
マオウ	1.5g

※添加物としてデキストリンを含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないで下さい。
- (4) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
電 話：03-3281-3363
受付時間：午前9:00から午後5:00まで
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

イスクラ産業株式会社

東京都中央区日本橋1-14-2

URL：<http://www.iskra.co.jp/>