

スプレー

第2類医薬品

水虫 たむしに

キョータップジェットスプレー

1日1回で効く

殺菌成分

テルヒナフィン塩酸塩

かゆみ止め成分 ジフェンヒドラミン

局所麻酔成分 リドカイン

1

90mL

【販売先】キョータップジェットスプレー

△使用上の注意

書いてはいいないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください 本剤による過敏症（例えば、発疹・発赤、かゆみ、はれ等）を起こしたことがある人 2. 次の部位には使用しないでください (1) 目や目の周囲、顔面、粘膜（例えば、口腔、鼻、咽等）、陰のう、外陰部等 (2) 湿疹 (3) 湿疹、ただれ、電氣や外傷のひどい患部

■相違すること 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 乳幼児 (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人 (4) 「湿疹」が「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」がはがはっきりしない人（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。） (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6) 患部が広範囲の人 (7) 患部が化膿している人 (8) 妊婦又は妊娠している可能性のある人 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師又は薬剤師に相談してください。(1) 使用後、次の症状があらわれた場合 間接位：皮ふ、症状：発疹・発赤、かぶれ、かゆみ、はれ、刺痛感、熱感、鱗屑・落屑（フケ、アカのような皮ふのはがれ）、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮ふの電氣 (2) 2週間位使用しても症状が良くならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合

【保管及び取り扱い上の注意】

(1) 直射日光のあたらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。(5) 火気に近づけないでください。(6) 使用済みの容器は火中に投じないでください。(7) 本剤は合成樹脂（スチロール等）を軟化したり塗料をとかしたりすることがあるので、床や家具等につかないようにしてください。

【注意・効果】みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】1日1回、適量を患部に噴霧してください。

＜用法・用量に関する注意＞
(1) 定められた用法を厳守してください。(2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。(3) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(5) 外用にのみ使用してください。(6) 本剤のついた手で、目や粘膜にふれないでください。(7) 容器をよく振ってから、ノズルを下に向けて、患部まで3cm以内の距離で噴霧してください。なお、噴霧口をよく握りかめ、顔面特に目に向けて噴霧したり、吸入しないでください。(8) 同じ場所に1秒以上噴霧しないでください。
【成分・分量】（総量100g中）テルヒナフィン塩酸塩…1g、リドカイン…2g、グリチルレチン酸…0.5g、ジフェンヒドラミン…1g、イソプロピルメチルフェノール…0.3g
添加物：エタノール、イソプロパノール、乳糖、LPG

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れてはいけないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：LPG

アルコール類(46mL)

危険等級Ⅱ 火気厳禁



会 員：缶

製造販売元 新新薬品工業株式会社 富山県富山市今市324番地 外

お客様相談室 ☎076-435-0878 受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用期限は底面に記載