

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

コンタクト装着時の不快感、目のかわき、目の疲れに

DHC ドライアイ目薬CL

<人工涙液>

第3類医薬品

DHCドライアイ目薬CLは、涙のような働きで瞳をうるおす、涙液補助成分配合の目薬です。コンタクトレンズ装着時の不快感をやわらげ、目のかわき、目の疲れ、かすみに効果を発揮します。ソフト・ハード・O₂・使い捨て、すべてのコンタクトレンズに対応し、コンタクトレンズを装着したままでも点眼可能。目にしめない処方です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

■ 効能・効果

目の疲れ、涙液の補助(目のかわき)、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)

■ 用法・用量

1回2～3滴、1日3～6回点眼してください。

【用法・用量に関連する注意】

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
2. 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
3. 点眼用にのみ使用してください。

■ 成分・分量

100mL中

塩化ナトリウム	550mg
塩化カリウム	150mg

添加物として、ハウ酸、ハウ砂、エデト酸ナトリウム水和物、ポリソルベート80、クロルヘキシジングルコン酸塩、ヒドロキシエチルセルロースを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボードなど高温下に放置したものは、薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
4. 他の人と共用しないでください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。
6. 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に白くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふき取って使用してください。

医薬品
相談室

tel. 03-3762-2581

受付時間 9:00～17:00（日・祝日をのぞく）

DHC

製造販売元

株式会社ディー・エイチ・シー

東京都港区南麻布 2-7-1 ☎0120-333-906

DHCホームページ

パソコン <http://www.dhc.co.jp>

携帯 <http://www.dhc.jp>