

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

あまくて のみ良い 子供かぜ薬

第②類医薬品

かぜの
熱・せき・いたみに

保寿小児 **ポツポ**

「かぜ」にかかると全身がだるくなり、さらに体力を消耗して思わぬ病気をひき起こすこともとなります。昔から「かぜ」は万病のもと、と言われてきました。「かぜ」は初期のうちに治すのが肝要です。軽い症状のうちに早めに手当し、十分な休養・栄養をとりましょう。本剤は憂うつな「かぜ」の諸症状をやわらげ体調を整え、元気な体になります。

⚠ 使用上の注意

本剤は小児用ですが、かぜ薬に定められた注意事項として、成人が服用される際のこと記載してあります。

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと。(1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと。他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。(眠気があらわれることがあります。)
4. 服用時は飲酒しないで下さい。5. 長期連用しないで下さい。

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 妊娠又は妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。(5) 高齢者。(6) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(7) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(8) 次の症状のある人。高熱、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経科	めまい
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振	その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれます。
皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれます。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれます。
間質性肺炎	空せき(たんを伴わないせき)を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれます。(これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けて下さい。)
ぜ ん そ く	

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。
便秘、口のかわき

(裏面に続く)

効能・効果

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和。

用法・用量

次の量を1日3回、食後なるべく30分以内に服用して下さい。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
7歳以上～11歳未満	1包	3回
5歳以上～7歳未満	$\frac{2}{3}$ 包	
3歳以上～5歳未満	$\frac{1}{2}$ 包	
1歳以上～3歳未満	$\frac{1}{3}$ 包	

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量

1日量（3包：1包…0.6g）中

はたらき	成 分	含量
かぜによる不快なたん、 せきを抑えます	ノスカピン	24mg
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	24mg
かぜによる悪寒や発熱を おさえ、頭痛や関節、筋 肉の痛みをしずめます。	エテンザミド	300mg
	アセトアミノフェン	270mg
	無水カフェイン	45mg
かぜによるくしゃみ、鼻 みず、鼻づまりといった 諸症状を緩和します。	クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.75mg

添加物として、サッカリナトリウム水和物、グリチルリチン酸モノアンモニウム、乳糖水和物、パレイショデンプン、軽質無水ケイ酸、赤色3号色素、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせ先 富山薬品株式会社
お客様相談窓口 ☎(076)435-0139
受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元：富山薬品株式会社
富山市四方西岩瀬石瀬175

