

# 目の疲れ・目のかすみ\*・充血に ロートアイウィッシュ<sup>®</sup>α

## 3つの栄養成分 + 角膜保護成分

パソコンや携帯電話などで酷使した目の疲れに、  
3つの“アミノ酸類・ビタミン”が目の細胞の代謝を促進し、  
疲れた目を活性化します。

さらに、“コンドロイチン硫酸エステルナトリウム”が  
角膜表面を保護して疲れた目を改善します。

疲れた目を活性化する

### パントテノール


パントテン酸類の中でも、  
目の健康維持に不可欠な  
ビタミンB群の一種で、  
疲れ目に効果的な成分です。

### ビタミンB6

アミノ酸やタンパク質の  
代謝を促進するビタミン。  
目の細胞の代謝を活発に  
し、疲れ目を改善します。

### L-アスパラギン酸カリウム

代謝に重要な役割を果たすアミノ  
酸の一種。目の細胞呼吸を活性化  
し、酸素を取りこんで、目の疲れを  
改善します。



角膜を保護する

### コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム

涙の成分の一つで、角膜表面  
を保護して、疲れた目を  
改善します。

\*目やにの多いときなど

抗ヒスタミン作用を持つクロルフェニラミンマレイン酸塩配合で、目のかゆみを抑えます。

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる  
フリーアングルノズル<sup>®</sup>



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式スクリューキャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も  
右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

## 使用上の注意

### 相談すること



1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人…はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人… 緑内障

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみ改善されない場合
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

## 効能・効果

目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、結膜充血、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

## 用法・用量

1回2～3滴、1日5～6回点眼してください。

### 【用法・用量に関連する注意】

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
〈汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〉  
また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用におのみ使用してください。



容器の先と目やまつ毛がふれることのないように

## 成 分

パンテノール0.1%、ビタミンB<sub>6</sub>0.05%、L-アスパラギン酸カリウム1%、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム0.1%、ネオスチグミンメチル硫酸塩0.005%、グリチルリチン酸二カリウム0.1%、塩酸テトラヒドロソリン0.01%、クロルフェニラミンマレイン酸塩0.01%

添加物として、アミノカプロン酸、塩化Na、 $\beta$ -メントール、d-カンフル、d-ボルネオール、グラニオール、ユーカリ油、プロピレングリコール、ペパーミントオイル、ベンザルコニウム塩化物、クロロブタノール、エデト酸Na、ポリソルベート80、pH調節剤を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 他の人と共用しないでください。
- (6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。  
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

### お問い合わせ先;お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを聞かせただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)