＊2014年11月改訂

この説明書は、お薬とともに保管し、ご使用の際にはよくお読みください。

かぜによる　のどの痛み、頭痛、発熱、せき　第2類医薬品

かぜ薬 アスミンEXゴールド

ゴオウ・地竜・桔梗・甘草等13成分配合

「アスミンEXゴールド」は、熱を下げ痛みによくきく生薬のゴオウ、地竜と洋薬のアセトアミノフェン、エテンザミド、無水カフェイン、せきをしずめる生薬のキキョウ、カンゾウと洋薬のデキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、鼻水、鼻づまり、くしゃみなどのアレルギー症状を抑えるクロルフェニラミンマレイン酸塩、栄養補給にチアミンジスルフィド、リボフラビン、毛細血管の強化にヘスペリジン等、13有効成分の生薬と洋薬との配合によりかぜの諸症状にすぐれた効き目をあらわします。

4種の和漢生薬
- 牛黄
- 地竜
- 桔梗
- 甘草

＋

9種の洋薬成分
- チアミンジスルフィド
- リボフラビン
- ヘスペリジン
- アセトアミノフェン
- エテンザミド
- クロルフェニラミンマレイン酸塩
- デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
- dl-メチルエフェドリン塩酸塩
- 無水カフェイン

使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1．次の人は服用しないこと

（1）本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

（2）本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2．本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3．服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと（眠気等があらわれることがある。）

4．服用前後は飲酒しないこと

5．長期連用しないこと

相談すること

1．次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

（1）医師又は歯科医師の治療を受けている人。

（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。

（3）授乳中の人。

（4）水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15歳未満）。

（5）高齢者。

（6）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

（7）次の症状のある人。　高熱、排尿困難

（8）次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2．服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状	関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	呼吸器	息切れ、息苦しさ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	泌尿器	排尿困難
精神神経系	めまい	その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック（アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群） 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
腎障害*	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。

裏面に続く

3．服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
口のかわき、眠気
4．5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分及び分量と働き　1日量(6カプセル)中

成分		分量	働き
生薬	ゴオウ(牛黄)	3mg	熱を下げ、のどの炎症をやわらげ、かぜの回復を助けます。
	ジリュウ(地竜)乾燥エキス(原生薬400mg)	51.94mg	熱を下げ、せきをしずめ、かぜの回復を助けます。
	キキョウ乾燥エキス(原生薬600mg)	60mg	せきをしずめ、たんを出しやすくし、かぜの回復を助けます。
	カンゾウ乾燥エキス(原生薬700mg)	140mg	せきをしずめ、炎症を抑えて、かぜの回復を助けます。
解熱鎮痛剤	アセトアミノフェン	540mg	熱を下げ、頭痛やのどの痛みをやわらげます。
	エテンザミド	400mg	
抗ヒスタミン剤	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどを抑えます。
鎮咳剤	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	45mg	せき中枢に作用し、せきをしずめます。
	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支をひろげ、せきをしずめます。
カフェイン剤	無水カフェイン	75mg	頭痛をしずめます。
ビタミン類	チアミンジスルフィド	8mg	消耗しがちなビタミンを補います。
	リボフラビン	6mg	
	ヘスペリジン	24mg	毛細血管の強化作用により炎症を抑えます。

添加物として、バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、カプセル剤皮に、ゼラチン、酸化チタン、ラウリル硫酸Naを含有します。

効能又は効果

かぜの諸症状（のどの痛み、頭痛、発熱、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法及び用量

次の量を、食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	2カプセル	3回
7歳以上15歳未満	1カプセル	
7歳未満	服用しないこと	

〈用法及び用量に関連する注意〉

（1）定められた用法及び用量を厳守すること。
（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
（3）カプセル剤の取り出し方
右図のようにカプセル剤の入っているＰＴＰシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる。)



保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
（2）小児の手の届かない所に保管すること。
（3）他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
（4）使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



お問い合わせ先
お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。
薬王製薬株式会社「お客様相談室」　電話 0744-33-8855
受付時間　9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

購入したお店：　　店	購入した日：　　年　　月　　日

製造販売元　**薬王製薬株式会社**　奈良県磯城郡田原本町245番地