

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ビタミンC主薬製剤

シミトールシリーズ

販売名:

トルビタ錠

第3類医薬品

ビタミンCには、しみ・そばかすの原因となるメラニンの生成を抑え、色素沈着を緩和する働きがあります。また、コラーゲンの生成を促進する働きもあります。ビタミンCは、人の体内では作ることができない為、医薬品や食品から摂取することが必要です。トルビタ錠は、6錠中に2000mgのビタミンCを含有した医薬品です。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

3. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効果・効能

- 次の諸症状の緩和：
しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着
- 次の場合の出血予防：
歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンCの補給：
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量

次の一回量を朝夕食後に水またはお湯で、かまわずに服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1～3錠	1日2回
11歳以上15歳未満	1～2錠	
7歳以上11歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

▼裏面もお読みください

成分・分量

1日量(6錠)中

成分	分量
ビタミンCとして	2,000mg
〔アスコルビン酸(ビタミンC) アスコルビン酸カルシウム(ビタミンCのカルシウム塩)〕	1,400mg 726mg
リポフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂)	6mg

添加物として、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、
ショ糖脂肪酸エステルを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1)本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤中のビタミンB₂によるものなので心配ありません。
- (2)本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。
(変色等の原因となり、品質が変わることがあります。)
- (5)使用期間を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持のため、6ヵ月以内に服用してください。

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記まで
ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

消費者相談窓口：水橋保寿堂製薬株式会社 お客様相談室

 **0120-50-4100**

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

水橋保寿堂製薬株式会社

富山県富山市水橋山王町633