

# ビルトン MAX

【成分・分量】 1本(50mL)中

トシシエキス ..... 50mg

(原生薬トシシとして500mg)

イカリソウエキス ..... 100mg

(原生薬イカリソウとして1000mg)

ニンジンエキス ..... 60mg

(原生薬ニンジンとして666mg)

オキソアミチン末 ..... 50mg

(加工ダイサン末)

チアミン硝化物(ビタミンB<sub>1</sub>硝酸塩) ... 10mg

リボフラビンリン酸エステルナトリウム

(ビタミンB<sub>2</sub>リン酸エステル) ... 5mg

ピリドキシン塩酸塩 ..... 10mg

(ビタミンB<sub>6</sub>)

無水カフェイン ..... 50mg

添加物: クエン酸、dl-リンゴ酸、白糖、D-

ソルビトール、ハチミツ、パラベン、プロ

ピレングリコール、エタノール、香料

## 【効能・効果】

○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉体疲

労・病中病後・食欲不振・栄養障害

・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

## 【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1本(50mL)を1日1回服用してください。

○用法・用量を厳守すること。

## 滋養強壮・虚弱体質

# BILTON

## ビルトンマックス

# MAX

第2類医薬品

50mL

製造販売元

中外医薬生産株式会社  
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

## 【使用上の注意】

### ■相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状       |
|------|-----------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ |

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

02MAELCH

製造番号

使用期限