

ビルトン[®]MAX

【成分・分量】1本(50mL)中
トシジエキス ……………50mg
(原生薬トシジとして500mg)
イカリソウエキス ……………100mg
(原生薬イカリソウとして1000mg)
ニンジンエキス ……………60mg
(原生薬ニンジンとして666mg)
オキソアミサン末 ……………50mg
(加工ダイサン末)
チアミン塩化物(ビタミンB₁併酸塩) ……10mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム
(ビタミンB₂リン酸エステル) ……5mg
ピリドキシン塩酸塩 ……………10mg
(ビタミンB₆)
無水カフェイン ……………50mg
添加物:クエン酸、dL-リンゴ酸、白糖、D-
ソルビトール、ハチミツ、パラベン、プロ
ピレングリコール、エタノール、香料

【効能・効果】

○滋養強壮 ○虚弱体質 ○肉体疲
勞・病中病後・食欲不振・栄養障
害・発熱性消耗性疾患・産前産
後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1本(50mL)
を1日1回服用してください。
○用法・用量を厳守すること。

第2類医薬品 50mL

滋養強壮・虚弱体質
ビルトン[®]MAX

BILTON
MAX



製造販売元
中外医薬生産株式会社
三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

△【使用上の注意】

★相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は
副作用の可能性があるため、直ちに服
用を中止し、この製品を持って医師、薬
剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

2.しばらく服用しても症状がよくなりな
い場合は服用を中止し、この製品を持
って医師、薬剤師又は登録販売者に相
談すること

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保
管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用
の原因になったり品質が変わる)。
- (4)表示の使用期限を過ぎた製品は服用し
ないこと。

本剤は生薬成分を配合していますので、沈
殿を生じることがあります。よく振ってから
服用してください。

O1MAELTR

製造番号

使用期限