

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

〈みずむし・たむし用薬〉

オノフェV水虫クリーム

第2類医薬品

水虫・たむしは、白癬菌というカビが皮膚の角質層等に寄生して起こる皮膚病で、かゆみや痛みを伴うことがあります。

オノフェV水虫クリームには5種類の有効成分を配合。1日1回の使用により、水虫・たむしのかゆみや痛みを伴う不快な症状を改善します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないでください

(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。

(2)湿疹。

(3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊娠又は妊娠していると思われる人。

(3)乳幼児。

(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5)患部が顔面又は広範囲の人。

(6)患部が化膿している人。

(7)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。

(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、熱感、落屑、ただれ、水疱、乾燥感、ヒリヒリ感、亀裂

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合、又は、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】 みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】 1日1回、適量を患部に塗布してください。

(用法・用量に関する注意)

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】

100g中

ブテナフィン塩酸塩.....1.0g

リドカイン.....2.0g

dl-カンフル.....1.0g

クロタミトン.....5.0g

グリチルレチン酸.....0.5g

* 添加物としてセタノール、ステアリルアルコール、セバシン酸ジエチル、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、パラベン、BHTを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。
- (5) チューブの口に穴を開ける際にチューブを強く握り過ぎるとクリームが多く出る場合がありますのでご注意ください。

水虫治療のポイント

- 患部はいつも清潔にしましょう。靴下や靴等も清潔なものを使用しましょう。
- 白癬菌の寄生は、症状のあらわれている範囲より広がっていることが多いため、薬剤は広めに塗布しましょう。
- かゆみ等がなくなても、再発することがあるためしばらくの間は根気よく治療を続けましょう。
- 患部のむれを防ぎ、乾燥に心がけましょう。

本品についてお気づきの点がございましたら、
お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

新新薬品工業株式会社 CHC事業部 お客様相談室

〒930-2221 富山県富山市今市324番地


電話番号 076-435-0878(土、日、祝日を除く 9:00~17:00)

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

販売元 新新薬品工業株式会社
富山県富山市今市324番地

製造 販売元 万協製薬株式会社
三重県多氣郡多氣町五桂1169-142



●チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出してください。

(①→②)



●チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。

折り曲げないでください。

折りたたまないでください。