



服用に際しては、説明文書をよく読むこと

ビタミン含有保健薬

【販売名】 第3類医薬品
ローヤルマムシゲン内服液

【使用上の注意】 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、下痢

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

●滋養強壮 ●虚弱体質 ●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上) 1日1回1瓶(50mL)を服用する。

【用法・用量に関連する注意】

1. 15歳未満は服用しないこと。
2. 定められた用法・用量を厳守すること。

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

紙 ガラス：瓶
金 属：キャップ

S1



肉体疲労時の
栄養補給
滋養強壮



ローヤル
マムシゲン内服液

ROYAL
MAMUSHIGEN

*Agkistrodon japonicae
Bezoar orientale*

第3類医薬品

50mL

【成分・分量】 成人1日量(50mL)中
マムシ抽出液(原生薬換算:100mg)…0.5mL
ゴオウ抽出液(原生薬換算:2mg)…40mg
ジャコウシ流エキス(原生薬換算:300mg)…0.3mL
日局 タウリン……………500mg
カルニチン塩化物……………100mg
日局 チアミン塩化物(ビタミンB₁硝酸塩)…10mg
日局 リボフラビンリン酸エステルナトリウム
(ビタミンB₂リン酸エステル)…3mg
日局 ニコチン酸アミド……………20mg
日局 無水カフェイン……………50mg
添加物:白糖、スクラロース、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、カラメル、安息香酸Na、パラベン、エタノール、香料、バニリン、1-メントール(アルコール0.39mL以下)

【成分・分量に関連する注意】

1. 本剤に含有されているリボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB₂リン酸エステル)により、尿が黄色くなることがあります。
2. 本剤に配合されている生薬成分により、混濁又は沈殿を生じることがありますが、品質上問題はありません。よく振ってお飲みください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

【お客様相談室】

電話 06-6131-1300
(祝祭日を除く月～金曜日
10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
大阪市北区曽根崎2丁目7番4号
<http://www.sakampow.com>


ROYAL
MAMUSHIGEN

ローヤルマムシゲン内服液

第3類医薬品



肉体疲労時の
栄養補給
滋養強壮



ローヤル
マムシゲン
内服液

ROYAL
MAMUSHIGEN

*Agkistrodon japonicae
Bezoar orientale*

第3類医薬品

50mL



製造番号

使用期限