

販売名：セビーハーブドリンク

【使用上の注意】

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
●長期連用しないこと

【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 高齢者。
 - (3) むくみのある人。
 - (4) 心臓病、高血圧、腎臓病の診断を受けた人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

皮膚：発疹
消化器：胸やけ、吐き気、下痢
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさしびれつっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】発熱性消耗性疾患・病中病後・栄養障害・食欲不振・肉体的疲労・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質

【用法・用量】成人（15才以上）1回1瓶（30mL）、1日2回服用する。なお、15才未満は服用しない。

●用法・用量を厳守すること。

金属：キャップ、ガラス：瓶

CEP/E

発熱性消耗性疾患時などの栄養補給、滋養強壮に

セビーハーブドリンク



30mL

第2類医薬品

【成分】1日量（2瓶60mL）中
カンゾウ乾燥エキス900mg（カンゾウ4500mgに相当）、コウジン乾燥エキス60mg（コウジン600mgに相当）、ショウキョウ流エキス0.5mL（ショウキョウ500mgに相当）、タウリン1000mg、ビタミンB₂リン酸エステル10mg、ビタミンB₆50mg

添加物：白糖、カラメル、ブチルパラベン、ポビドン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、クエン酸Na水和物、香料、パニリン、エチルパニリン、メントール、エタノール、プロピレングリコール、pH調節剤2成分（アルコール0.3mL以下）（保管及び取扱い上の注意）（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管する。（2）小児の手のとどかない所に保管する。（3）本剤はまれに湿潤することがあるが、薬効には変わりない。（4）使用期限を過ぎた製品は服用しない。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元
ゼリア新薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町10-11
お客様相談室 ☎03-3661-2080

セビーはゼリア新薬工業（株）の登録商標です。

製造番号

使用期限
〔年、月〕

