



中国の民間説話「白蛇伝」に登場する女性を伝統的な漢方のイメージとしてシンボルマークとしたものです。

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

はち み じ おう がん りょう

漢方製剤

# 八味地黄丸料エキス錠 N「コタロー」

商品番号

VO40

本剤は、漢方の古典「金匱要略」（後漢時代）収載の処方にもとづいてつくられたエキスを、飲みやすく錠剤としたものです。

漢方医学に腎氣ということがありますが、これは人間のからだの働きのもととなるエネルギーといえるもので、からだのみずみずしさや活力の源になると考えられています。

この腎気が中年以降になると徐々に失われ（腎虚といいます）、いわゆる老化現象があらわれるようになります。

八味地黄丸料エキス錠N「コタロー」は、腎氣を補う漢方薬として用いられ、尿の出が悪くなったり、軽い尿モレ、夜間よくトイレに起きたり、また足腰が痛むとか、目がかすんで小さな文字が読みにくいなどの症状に効果があります。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人には服用しないでください

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



### 相談すること

1. 次の人には服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状           |
|------|---------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ     |
| 消化器  | 食欲不振、胃部不快感、腹痛 |
| その他  | 動悸、のぼせ        |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

## 【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。

| 年齢        | 1回量        | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 大人（15歳以上） | 4錠         | 3回     |
| 15歳未満7歳以上 | 3錠         |        |
| 7歳未満5歳以上  | 2錠         |        |
| 5歳未満      | 服用しないでください |        |

## 〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。


## 【成分・分量】

| 成分・分量（本剤12錠中）                       |      |       |      |
|-------------------------------------|------|-------|------|
| ジオウ                                 | 2.5g | タクシャ  | 1.5g |
| サンシュユ                               | 1.5g | ブクリョウ | 1.5g |
| サンヤク                                | 1.5g | ボタンピ  | 1.5g |
| より抽出したハ味地黄丸エキス散（1/2量）3.18gを含有しています。 |      |       |      |

添加物としてカルメロースカルシウム、含水二酸化ケイ素、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、アメ粉を含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。
- (5)ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6)ビンの中の詰めものは、フタを開けた後はすぐしてください。  
(詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのものですので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わることがあります)
- (7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室

大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106

受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元



漢方をよりよく より多くの人に  
**小太郎漢方製薬株式会社**

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号  
TEL 06 (6371) 9106