

服用に際しては、この説明文をよく読むこと。
ビタシー 1000 (ビタミン含有保健剤)
使用上の注意[相談すること] 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること/皮ふ：発疹/消化器：胃部不快感・下痢 2.しばらく服用しても症状がよくなる場合、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
成分・分量 1日量(100mL)中 チアミン硝化物(ビタミンB1)5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)5mg、ニコチン酸アミド20mg、無水カフェイン50mg、タウリン1,000mg、ローヤルゼリーチンキ50mg、エレウテロコックエキス10mg(原生薬換算量200mg) 添加物：液糖、D-ソルビトール、スクラロース、pH調整剤(クエン酸)、安息香酸Na、香料(エタノール、エチルパニリン、パニリン)(アルコール0.2mL以下)

●ビタミンB2により尿が黄色くなることがある。
効能・効果 ○滋養強壮○虚弱体質○肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
用法・用量 成人(15才以上)1日1回、1びん(100mL)を服用すること。

指定医薬部外品 100mL

常盤薬品
NOEVIR GROUP

滋養強壮・栄養補給

ビタシー

タウリン1000mg

ローヤルゼリー

エレウテロコック配合

●用法・用量を守ること。
(他のビタミンなどを含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取などに注意すること。) 保管および取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)他の容器に入れかえないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)期限を過ぎた製品は服用しないこと。(5)生薬を含むため、まれに混濁を生じることがありますが、服用には支障はありません。

常盤薬品工業株式会社

NOEVIR GROUP

本社 神戸市中央区港島中町6-13-1

製造販売元 三重県伊賀市白檜字永谷2604-5

お問い合わせは 0120-875-710まで

www.tokiwayakuhin.co.jp

013040

金属：キャップ ガラス：びん ALE403

使用期限

製造番号

