

服用に当たって、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第②類医薬品

鎮咳去痰薬

コデカイン[®]顆粒M

◇本剤はセキサンエキスをはじめ、中枢性の鎮咳作用を有するジヒドロコデインリン酸塩、気管支拡張作用を有するdl-メチルエフェドリン塩酸塩などの成分を含んだ顆粒剤です。

⚠〔使用上の注意〕

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用をしないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
(眠気等があらわれることがある。)
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
4. 過量服用・長期連用をしないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(6)次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

裏面もお読みください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能又は効果】

せき、たん

【用法及び用量】

次の量を1日3回、食後に服用してください。

年 齢	1 回 量
成人(15歳以上)	1 包
11歳以上15歳未満	$\frac{2}{3}$ 包
8歳以上11歳未満	$\frac{1}{2}$ 包
5歳以上8歳未満	$\frac{1}{3}$ 包
5歳未満	服用しないこと

【用法及び用量に関連する注意】

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分及び分量】 3包(1包1.1g)中

ジヒドロコデインリン酸塩…30mg・d-メチルエフェドリン塩酸塩…72mg

クロルフェニラミンマレイン酸塩…12mg・無水カフェイン……………105mg

セキサンエキス(セキサン100mgに相当)……………12.5mg

添加物として結晶セルロース、乳糖水和物、d-ボルネオール、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。

商品のお問い合わせはお買い求めの薬局、薬店又は下記をお願いします。

発売元・お問い合わせ先

松本製薬工業株式会社

TEL 0748-88-3196

受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
〒520-3433 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場160

製造販売元

ユニテックメディカル株式会社

〒635-0143 奈良県高市郡高取町車木323-1

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931