

こりと痛み2

開封口

スポーツの筋肉痛に  
**レモンパスA**

- 筋肉痛
  - 捻挫
  - 肩のこり
  - 腰のいたみ
- (気孔付)

第3類医薬品 **セルフメサケーション**  
税 控除 対象

中部薬品株式会社



こりと痛み2  
使用期限  
製造販売元

販売元 中部薬品株式会社 製造販売元 大協薬品工業株式会社  
富山県射水市戸破69-12 富山県水橋町寺173  
副作用被害救済制度 電話：0120-149-931 お客様相談窓口 電話：076-479-1313  
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

第3類医薬品

使用上の注意  
1) 1~2回、ラテナーをはがし、患部に貼ってください。

- (用法及び用部に関連する注意)
- 1) 用法及び用部を守ってください。
  - 2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。
  - 3) 貼った患部をコウヤク電氣毛布等で温めなさい。
  - 4) 貼をいれた後、患部がぬれている時は、よく蒸かさない。
  - 5) 皮膚の弱い人は、使用開始直前の患部の弱い部分に、1~2cm角の巾を自作して之を半日以上貼り、発赤、発熱、かゆみ、かぶれ等の症状が起さないことを確かめてから使用してください。
  - 6) 皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。
- 【禁忌及び取扱い上の注意】
- 1) 腫瘍及び其の疑いのあるもの、悪臭の多い所に貼らないでください。
  - 2) 汗の多い所に貼らないでください。
  - 3) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。
  - 4) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。
  - 5) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。
  - 6) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。

- 使用上の注意
- 1) 1~2回、ラテナーをはがし、患部に貼ってください。
  - 2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。
  - 3) 貼った患部をコウヤク電氣毛布等で温めなさい。
  - 4) 貼をいれた後、患部がぬれている時は、よく蒸かさない。
  - 5) 皮膚の弱い人は、使用開始直前の患部の弱い部分に、1~2cm角の巾を自作して之を半日以上貼り、発赤、発熱、かゆみ、かぶれ等の症状が起さないことを確かめてから使用してください。
  - 6) 皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。
- 【禁忌及び取扱い上の注意】
- 1) 腫瘍及び其の疑いのあるもの、悪臭の多い所に貼らないでください。
  - 2) 汗の多い所に貼らないでください。
  - 3) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。
  - 4) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。
  - 5) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。
  - 6) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。

外用鎮痛消炎薬 **レモンパスA**

使用上の注意

- 【禁忌及び取扱い上の注意】
- 1) 腫瘍及び其の疑いのあるもの、悪臭の多い所に貼らないでください。
  - 2) 汗の多い所に貼らないでください。
  - 3) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。
  - 4) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。
  - 5) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。
  - 6) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。

- 使用上の注意
- 1) 1~2回、ラテナーをはがし、患部に貼ってください。
  - 2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。
  - 3) 貼った患部をコウヤク電氣毛布等で温めなさい。
  - 4) 貼をいれた後、患部がぬれている時は、よく蒸かさない。
  - 5) 皮膚の弱い人は、使用開始直前の患部の弱い部分に、1~2cm角の巾を自作して之を半日以上貼り、発赤、発熱、かゆみ、かぶれ等の症状が起さないことを確かめてから使用してください。
  - 6) 皮膚の弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。
- 【禁忌及び取扱い上の注意】
- 1) 腫瘍及び其の疑いのあるもの、悪臭の多い所に貼らないでください。
  - 2) 汗の多い所に貼らないでください。
  - 3) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。
  - 4) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。
  - 5) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。
  - 6) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。

3. 5-6日間使用しても症状がよくなりません場合は、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

内容	1枚
包装	10枚

【禁忌及び取扱い上の注意】

- 1) 腫瘍及び其の疑いのあるもの、悪臭の多い所に貼らないでください。
- 2) 汗の多い所に貼らないでください。
- 3) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。
- 4) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。
- 5) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。
- 6) 患部の腫れがひどくなるまで貼らないでください。

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

【禁忌及び取扱い上の注意】

T12

製造販売元

使用期限

こりと痛み2