

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

気になる傷あとなどを目立たなくする

外皮用薬
非ステロイド剤

トフラックスHPクリーム

第2類医薬品

トフラックスHPクリームの特徴

血行促進作用・抗炎症作用・保湿作用を持つ「ヘパリン類似物質」が、血流の循環を良くして、皮膚の再生を促進し、炎症による荒れた皮膚症状を鎮め、保湿作用により肌の防御機能を高めることで、気になる傷あとなどを改善していきます。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 次の人は使用しないでください。
出血性血液疾患（血友病、血小板減少症、紫斑病など）の人
2. 次の部位には使用しないでください。
目や目の周囲、粘膜（口腔、鼻腔、膣など）



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

きず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり（顔を除く）、手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮膚、しもやけ（ただれを除く）、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、またはガーゼなどにのぼして貼ってください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(3)本剤は外用にのみ使用してください。

※出血のある傷口には使用しないでください。(血が止まりにくくなることがあります。)

※顔面にある傷あと、やけどのあとには使用しないでください。

●チューブの折り(尾)の部分から先端に向けて順に押し出して
ください。(①→②)

●チューブが破れて薬剤がとび出るおそれがあります。



折り曲げないでください。 折りたたまないでください。

【成分・分量】

100g中に次の成分を含みます。

成分	分量	はたらき
ヘパリン類似物質	0.3g	血行促進作用、抗炎症作用、保湿作用があります。

添加物としてセタノール、ステアリルアルコール、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油50、グリセリン、プロピレングリコール、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、エドト酸ナトリウム水和物、白色ワセリン、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、スクワラン、トリエタノールアミンを含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

本品についてのお問い合わせは
お買い求めのお店または下記にお願い致します。

万協製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0598-30-5376

受付時間 10:00～17:00
(ただし、土、日、祝祭日は除きます。)

発売元

京都薬品ヘルスケア株式会社
京都市中京区西ノ京月輪町38番地

製造販売元

 万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町五柱1169-142