

この添付文書は、服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保存しておいてください。

第3類医薬品

ビタミンB₂B₆主薬製剤

肌あれ、にきび、口内炎、皮膚炎などの緩和に

ニッポークリーンFC

ビタミンC

パントテン酸カルシウム配合

ビタミンB₂・B₆が不足すると肌あれ、にきび、口内炎、皮膚炎等の症状が現れやすくなります。肉体疲労時、妊娠・授乳期、また、脂肪の多い食事でも、ビタミンB群が不足することがあります。

ニッポークリーンFCは、「脂質代謝のビタミン」であるビタミンB₂、「たんぱく質代謝のビタミン」であるビタミンB₆に加えて、これらの作用を助けるビタミンB群のニコチン酸アミド（B₃）とパントテン酸カルシウム（B₅）を配合することにより、ビタミンB₂・B₆の不足で現れる皮膚及び粘膜の諸症状を緩和します。さらに、メラニン色素生成の抑制やコラーゲンの生成にも関与するビタミンCの配合がビタミンB群の働きを助けると共に、パントテン酸カルシウムがビタミンCの働きを助けるなど、配合されたビタミンが相互に助け合って肌の健康を保ちます。

ニッポークリーンFCはフィルムコート錠なので飲みやすく、苦味もないのでお子様（7歳以上）にも服用しやすくなっています。

⚠️ [使用上の注意]



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状が現れた場合副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、胃部膨満感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

次の諸症状の緩和：

口角炎、口唇炎、口内炎、舌炎、湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ、にきび、肌あれ
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、
医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。」

次の場合のビタミンB₂B₆の補給：

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数	
大人（15歳以上）	2錠	1～2回	1日2回服用する場合は 朝夕服用する。
7歳以上15歳未満	1錠		
7歳未満	服用しないこと。		

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法、用量を守ってください。
- (3) 錠剤の取り出し方（PTP包装の場合）

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、錠剤を取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



成分・分量

本剤は、淡橙色のフィルムコート錠で、4錠中に次の成分を含有しています。

	成 分	分 量
日本薬局方	リボフラビン酪酸エステル（ビタミンB ₂ 酪酸エステル）	20.0mg
	ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	100.0mg
	アスコルビン酸（ビタミンC）	400.0mg
	パントテン酸カルシウム	20.0mg
	ニコチン酸アミド	60.0mg

添加物として乳酸Ca、リン酸水素Ca、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール、黄色4号（タートラジン）、黄色5号、カルナウバロウを含有する。

【成分・分量に関連する注意】

- 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。医師の治療を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師にお知らせください。
- 本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂酪酸エステルが吸収され、その一部が尿中に排出されるためで心配ありません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れしないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4) 本剤をぬれた手で触れないでください。錠剤の表面が剥がれることがあります。
- (5) ビン開け口の詰め物は輸送中の錠剤破損防止用です。開栓後は不要となりますので捨ててください。
- (6) ビン内に入っている乾燥剤シリカゲルは服用しないでください。
- (7) 一度開封した後は、品質保持の点から早目に服用してください。なお外箱及びラベルに表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (8) PTPシートを切り離すときは、変質の原因となりますので、裏面のアルミ箔に傷をつけないようにしてください。

包装

60錠(ビン入り) 180錠(ビン入り) 500錠(PTP入り)

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

電話：03(3370)7174（代表） 受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

発売元 日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元 興亜製薬株式会社
横浜市港北区箕輪町2-17-5