

服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

販売名:パンシロンキュア^a 胃腸薬

すっきり
服用感

ストレス・飲み過ぎによる 胃痛・胸やけに

パンシロン[®]キュア^a

第2類医薬品


こんな状況下によく効きます



空腹時によく
ギューッと痛む



ムカムカする
胃の不快感に



製品の特徴

ストレスやアルコールなどによって胃に負担がかかると、胃酸が出過ぎて、胃酸の逆流が起こりやすくなります。

「パンシロンキュア」は胃酸の出過ぎや胃酸の逆流などで起こる胃の痛み、胸やけといった胃の不快症状に3つの作用でアプローチし、胃酸から胃を守りながら痛み・胸やけを和らげる胃腸薬です。

胃粘膜の
保護作用

出過ぎた胃酸の
中和作用

胃酸分泌
抑制作用



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください。

- (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (2) 透析療法を受けている人

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある)

4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 授乳中の人
- (3) 高齢者
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 次の症状のある人
 - 排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人
 - 緑内障、腎臓病、甲状腺機能障害

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、胃部膨満感
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難
その他	目のかすみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

便秘、下痢、口のかわき

4.2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

■効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲み過ぎ（過飲）、胃痛

■用法・用量

次の量を食前又は食間の空腹時に水又はお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1包	3回
15才未満	服用しないこと	

*食間とは…食後2～3時間をさします。

（用法・用量に関連する注意）

（1）用法・用量を厳守してください。

■成分・分量（1日量3包中）

有効成分	配合量
水酸化マグネシウム	450mg
合成ヒドロタルサイト	780mg
沈降炭酸カルシウム	900mg
ホップ乾燥エキス-Q	33.2mg(ホップとして471.5mg)
アルジオキサ	150mg
ピレンゼピン塩酸塩水和物	46.9mg

添加物：キシリトール、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、炭酸水素ナトリウム、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、トコフェロール酢酸エステル、ℓ-メントール、香料

■保管及び取扱上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる）
- （4）使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は服用しないでください。

なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00（土、日、祝日を除く）

〇ート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

401276701