

セルフメディケーション  
の  
秘 訣 控 制 対 象



大正製薬

# DicloTECT

# ジクロテクト PRO スプレー

第2類  
医薬品

90g

スワッシュした清涼感  
(メントール配合)

つらい  
**筋肉痛**  
打撲に

スポーツ時にも  
サッとひと吹き  
浸透して効く!

ジクロフェナクNa配合

使用前に次の説明文を必ずお読みください。

### ジクロテクトPROスプレー 鎮痛消炎薬

【使用上の注意】

してはいけないこと

### 第2類医薬品

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起  
りやすくなります)

1. 次の人には使用しないでください。(1)本剤又は  
本剤の成分にアレルギー症状を起こしたことが  
ある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)  
妊娠又は妊娠していると思われる人。(4)15才  
未満の小児。(5)次の部位には使用しないでくださ  
い。(1)目の周囲、粘膜等。(2)皮膚の弱い部位  
(顔、頭、首の下部等)。(3)湿疹、かぶれ、傷口。(4)  
目もじり、むしり等又は化膿している患部。3. 本剤  
を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用  
しないでください。4. 長期連用しないでください

【相談すべし】1. 次の方は使用前に医師、薬剤師  
又は登録販売者に相談してください。(1)医師の  
治療を受けている人。(2)薬量によりアレルギー  
症状を起こしたことがある人。(3)次の医薬品の  
投与を受けている人。ニューキノロン系抗菌剤  
2. 使用中は使用後、次の症状があらわれた場合は  
副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止  
し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売  
者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、 刺激感、熱感、皮膚のあれ、落屑(らくせつ) (フケ)、アカのような皮膚のはれ、水疱、 色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんまし ん、声のかすれ、くしゃみ、のどのか ゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等 があらわれます。
塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、 はれ、刺激感、水疱、たれ等の激しい 皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわ れ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状 が全身にひろがる場合があります。また、 日光があつた部位に症状があらわれ たり、悪化することがあります。	
接触皮膚炎、 光線過敏症	

3. 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は  
使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は  
登録販売者に相談してください。【効能】関節痛、  
肩こりに伴う肩の痛み、腱鞘炎(手・首の痛み)、  
肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫  
【用法・用量】1日3〜4回適量を患部に噴射塗布して  
ください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の透気  
性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を  
含む他の外用剤を併用しないでください。 (A)

【容器】フィルム:PP  
キャップ:PP

副用者被毒救済制度  
☎0120-149-931

アルミ:缶 使用期限(西暦年/月):底面に記載

【注意】(1)定められた用法・用量を厳守してください。  
(2)本剤は、痛みやはれ等の原因となつてい病気を  
治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治  
療する薬剤ですので、症状がよくなる場合だけ使用して  
ください。(3)1週間あたり原液として50g(8日前で本剤  
1本)を超えて使用しないでください。(4)目に入らな  
いよう注意してください。万一、目に入った場合には、  
すぐに水はぬるさ湯で洗ってください。なお、症状が  
重い場合には、医師の診察を受けてください。(5)患  
部部位には、他の外用剤を併用しないでください。(6)顔  
に向けて噴射しないでください。(7)大量・広範囲には  
使用しないでください。(8)外用のみで吸入し、吸入し  
ないでください。吸入によりめまい、吐き気等の症状  
を起こすことがあるので、できる限り吸入しないよう、  
また周囲の人にも十分注意して使用してください。  
(9)使用前によく振とうし、真下に向けて噴射してくだ  
さい。(10)患部まで約10cmの距離で噴射してください。  
(11)同じ箇所を連続して3秒以上噴射しないでください。  
(12)透気性の悪いもの(ラップフィルム、矯正ベルト等)  
で使用部位を覆い、密封状態にしないでください。

【成分】原液100g中 ジクロフェナクナトリウム1.0g、メ-  
ントール3.0g 添加物:アジピン酸ジエチルプロピル、乳酸、プロ  
ピレノールアルコール、ポリリノールベート、80、エンターール、DMG、LPG  
【保管及び取扱上の注意】(1)高温を避け、直射日光の  
当たらない涼しい所に保管してください。(2)火気につけ  
ないでください。(3)小児の手の届かない所に保管してく  
ださい。(4)合成樹脂を軟化させる力、塗料を溶かしたり、  
金属を変色させるおそれがありますので、付着しないよう  
に注意してください。(5)他の容器に入れ替えることがあり  
ます。(誤用の原因になつたり品質が変わることがありま  
す)。(6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

## 火気と高温に注意

高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、  
下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くに使用しないこと。
  - ②火気を使用し  
ている室内で大量に使用しないこと。
  - ③高温にすると破裂  
の危険があるため、直射日光の当たった所やストーブ、ファン  
ヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かない  
こと。
  - ④火の中に入れないこと。
  - ⑤使い切って捨てること。
- 高压ガス: LPG/DMG

●捨てる時は、火気のない屋外で噴射音が消える  
までガスを抜いてください。

火気厳禁 第一石油類 エタノール 65.0mL

発売元

大正製薬株式会社  
東京都墨田区高田3丁目24番1号  
http://www.taisho.co.jp

お客様119番室  
電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土・日・祭日も可)

製造販売元 161173  
同仁医薬化工株式会社

東京都中野区弥生町5-2-2

