

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

柴胡桂枝湯エキス配合  
かぜ薬**ガノン<sup>®</sup>顆粒KA-II** 第2類医薬品

くしゃみ、鼻水、発熱、頭痛など、かぜの症状がではじめたら、こじらせる前にできるだけ早く治すことが大切です。ガノン<sup>®</sup>顆粒 KA-II は、生薬からなる柴胡桂枝湯エキスと解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤、鎮咳剤、去痰剤などを効果的に配合した顆粒状のかぜ薬で、かぜの諸症状をやわらげ、健康な体への回復をたすけます。

**⚠ 使用上の注意****❌ してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

**1. 次の人は服用しないでください**

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

**※ (3) 12歳未満の小児。****2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください**

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

**3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気等があらわれることがあります。)****4. 授乳中の人は本剤を服用しないが、本剤を服用する場合は授乳を避けてください****5. 服用前後は飲酒しないでください****6. 長期連用しないでください****相談すること****1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。



甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

| 関係部位  | 症 状                |
|-------|--------------------|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ          |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振        |
| 精神神経系 | めまい                |
| 泌尿器   | 排尿困難、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感 |
| その他   | 過度の体温低下            |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称                                                        | 症 状                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー)                                           | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。                                |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(スティーブス・ジョンソン症候群)、<br>中毒性表皮壊死融解症、<br>急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。 |
| 肝機能障害                                                        | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                                          |
| 腎障害                                                          | 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。                                            |
| 間質性肺炎                                                        | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。                         |
| ぜんそく                                                         | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。                                                          |
| 再生不良性貧血                                                      | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。                          |
| 無顆粒球症                                                        | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。                                                                    |

(裏面へ続く)



## 相談すること (おもてより続く)

| 症状の名称 | 症 状              |
|-------|------------------|
| 呼吸抑制  | 息切れ、息苦しさ等があらわれる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 【効能・効果】

かぜの諸症状(悪寒、発熱、頭痛、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み、せき、たん、鼻水、鼻づまり、くしゃみ)の緩和

### 【用法・用量】

下記1回量を1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

| 年 齢        | 1 回 量   |
|------------|---------|
| 15歳以上      | 1 包     |
| 12歳以上15歳未満 | 2/3 包   |
| 12歳未満      | 服用しないこと |

#### <用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【主成分とその主な作用】 本品1日量[3包(1包1.15g)]中に、次の成分を含有します。

| 成 分                                           | 分 量                     | 主 な 作 用                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 柴胡桂枝湯エキス<br>(柴胡、半夏、桂皮、芍薬、黄芩、<br>人參、大棗、甘草、乾生姜) | 760mg<br>(処方換算量 5168mg) | 発熱、悪寒、頭痛、関節の痛み、吐き気などのある<br>かぜに特に効果があります。 |
| アセトアミノフェン                                     | 900mg                   | 熱を下げ、頭痛、関節の痛みをやわらげます。                    |
| d-クロルフェニラミン<br>マレイン酸塩                         | 3.5mg                   | かぜのアレルギー症状(鼻水・くしゃみ)をおさえます。               |
| ジヒドロコデインリン酸塩                                  | 24mg                    | せきをしずめます。                                |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩                               | 60mg                    | 気管支をひろげ、はげしいせきをしずめ、のどを楽にします。             |
| グアヤコールスルホン酸<br>カリウム                           | 240mg                   | のどにからむ痰をやわらかくし、出やすくします。                  |
| 無水カフェイン                                       | 75mg                    | 脳の血管に働いて「かぜ」による頭痛をやわらげ、眠<br>気を防止します。     |
| リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )                   | 12mg                    | ビタミンB <sub>2</sub> を補給し、体力の回復をたすけます。     |
| 合成ゲイ酸アルミニウム                                   | 1200mg                  | 胃の粘膜を保護し、他成分による胃腸障害をおさえます。               |


添加物として、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、サッカリンNa、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、二酸化ケイ素、乳糖、香料を含有します。

#### <成分・分量に関連する注意>

本剤に含まれているリボフラビン(ビタミンB<sub>2</sub>)により、尿が黄色になることがあります。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)1包の分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願い申し上げます。

天野商事株式会社 お客様相談室

電話：(052)951-2340

受付時間：9：00～17：00(土、日、祝日及び弊社休業日を除く)



発売元  
**天野商事株式会社**  
名古屋市中区丸の内三丁目13番12号



製造販売元  
**アスゲン製薬株式会社**  
岐阜県瑞浪市山田町李小洞 2008