

開封後は、袋の口を折り曲げて保管してください

第3類医薬品

消炎・鎮痛パップ剤

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 開封後は、開封口を折り曲げて保管してください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

リードパップDS (14cm×10cm)×5枚

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

リードバップDS

外用消炎鎮痛薬

第3類医薬品

【特長】

- 打撲、ねんざなどの急性炎症で、熱感があるときも、水分を含む基剤の湿布効果で適度な冷感が保たれ、有効成分の働きを助けます。
- 伸びのよい特殊な不織布を使用していますので、ひじやひざなどの関節部分の動きにもピッタリフィットします。
- はがすとき痛みがなく、はがした後皮膚に汚れが残らず、使用後がさわやかです。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外装を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外装を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能又は効果】

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法及び用量】

1日1～2回、膏面のライナーをはがし、患部に貼ってください。

＜用法及び用量に関連する注意＞

1. 定められた用法及び用量を守ってください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 患部の広さ、状態に応じて、ライナーの上から適当な大きさに切ってお使いください。
4. 必要に応じて包帯などで固定してください。

【成分及び分量】膏体100g(700cm²)中

サリチル酸メチル..... 1.5g
dl-カンフル..... 1.0g
l-メントール..... 0.8g
添加物として、濃グリセリン、カルメロースナトリウム、タルク、pH調整剤、乾燥水酸化アルミニウムゲル、ポリソルベート80、モノオレイン酸ソルビタン、酸化チタン、ポリアクリル酸部分中和物、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、アクリル酸デンプンを含有する。

発売元

リードケミカル株式会社 富山市日俣 77-3
お客様相談窓口 電話 076-425-1978
(土、日、祝日を除く9:00～17:00)

製造販売元



大協薬品工業株式会社

富山市水橋町 173



T11