

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬 ステロイド剤

頭皮などのかゆみ・湿疹

第②類医薬品

液体ダイアメルゾンEX

特徴

- 本剤は、かゆみや湿疹などの炎症症状のある患部ではすぐれた効果を発揮し、役目を終えた後は低活性物質に変化するアンテドラッグ型炎症抑制成分『プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル（PVA）』を主成分としています。
- ℓ -メントール配合で、清涼感があります。



使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1)水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
 - (2)創傷面、目の周囲、粘膜等
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4)患部が広範囲の人
 - (5)湿潤やただれのひどい人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚（患部）	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

（必ず裏面もお読みください）

【効能・効果】

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。
- (4)使用量は必要最小限にとどめてください。
- (5)定められた用法・用量を守ってください。
- (6)本剤塗布後、その部位を、ラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

＜プッシュ式液体容器の使用手法＞

容器を下向きにして、先端を患部に軽く押し当てて塗布してください。

【成分・分量】

本品1mL中

成 分	分 量	作 用
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	1.5mg	炎症を鎮める
クロタミトン	50mg	かゆみを抑える
イソプロピルメチルフェノール	1mg	殺菌作用
ℓ-メントール	35mg	クールな使用感

添加物：トリエタノールアミン、クエン酸水和物、ジブチルヒドロキシトルエン、ハアセチル
しょ糖、エタノール

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して、立てて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）。
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6)メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、アルコール類や油脂類等で変質・変色のおそれのあるもの（プラスチック製品、化学繊維、皮革、家具、床等）への本剤の付着は避けてください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願い申し上げます。

受付時間 9時～17時（土、日、祝日を除く）

新生薬品株式会社 消費者相談窓口 電話番号 076-472-0361

〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1

製造販売元 **新生薬品株式会社**

富山県中新川郡上市町横越16番1

SNO