

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

肌あれ イボに

ヨクイニン錠SH

生薬製剤

ハトムギの種皮を取り除いた種子である「ヨクイニン」は、古来よりいぼや皮膚のあれに優れた効果のある生薬として用いられてきました。ヨクイニン錠SHはその「ヨクイニン」からエキスを抽出し、飲みやすい錠剤にしたものです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、腹痛
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 下痢
- 1ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

〈効能・効果〉

いぼ、皮膚のあれ

〈用法・用量〉

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。
(食間とは、食後2～3時間を指します。)

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15才以上)	4錠	3回
7才以上15才未満	3錠	
5才以上7才未満	2錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〈成分・分量〉

成人1日量12錠中に以下の成分を含みます。

成 分	分 量
ヨクイニンエキス(原生薬換算量 15000mg)	1500mg
ヨクイニン末	300mg

添加物：クロスカルメロースNa、含水二酸化ケイ素、カルメロースCa、カルメロースNa、ステアリン酸Mg、結晶セルロース

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は天然物(ヨクイニン)のエキスを用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります。又、錠剤の表面に見られる黒褐色の斑点は、ヨクイニンによるものです。

保管及び取り扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- 4.本剤にぬれた手で触れないでください。
又、手にとった錠剤を元の容器に戻しますと、他の錠剤に影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 5.使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■本製品内容についてのお問い合わせ先

おくすり相談室

電 話：☎0120-419-111

受付時間：10時から18時まで(土、日、祝日を除く)

発 売 元 **新日本製薬株式会社**
福岡市中央区大手門1-4-7

製造販売元 **株式会社 新日本医薬**
福岡市博多区吉塚8-7-11