

満量処方

しゃくやくかんぞうとう

芍薬甘草湯

第2類医薬品

21包

第2類医薬品

21包

芍薬甘草湯

しゃくやくかんぞうとう

足のつり・

こむらがえりに

満量処方

眠くなる成分は入っていません

のみやすい

顆粒タイプ

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：
こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



4 987076 314568

製造番号

使用期限



袋：PE、金属



箱

S3

△使用上の注意

❌ **【してはいけないこと】**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
(1) 生後3ヵ月未満の乳児
(2) 次の診断を受けた人：心臓病
2. 症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないでください

🗨️ **【相談すること】**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊娠又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 次の症状のある人：むくみ (5) 次の診断を受けた人：高血圧、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

押して開ける

第2類医薬品

こむらがえり・腹痛・腰痛に

足がつった!

のみやすい
顆粒タイプ

スビット顆粒
(芍薬甘草湯)

満量処方

持ち運びに
便利な分包品
21包

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：
こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛