

## 日本薬局方 エバスチン錠

アレルギー専用鼻炎薬

## エバステルAL

アレルギー性鼻炎の症状は、花粉やハウスダストなどを吸い込んだときに、アレルギー誘発物質（ヒスタミン等）が体のなかで放出されることで起こります。エバステルALは、このアレルギー誘発物質の作用を阻害し、さらにその放出を元から抑えることで、アレルギー性鼻炎の症状に優れた効果を発揮します。

エバステルALは、1日効果が持続するお薬です。1日1回就寝前に服用すると翌日の夜まで効果が持続します。個々の生活習慣や生活環境、社会環境などが一様でないため、アレルギー症状は症状の重さやタイミングを予測しづらいのが現状です。

エバステルALは、このような予測しづらい症状に対応できますし、薬を携帯する必要もありません。

※花粉などの季節性のアレルギーによる症状に使用する場合は、症状の軽い早めの時期からの服用がより効果的です。

## ⚠ 使用上の注意

## ❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

## 1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 15歳未満の小児。

## 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のアレルギー用薬（皮膚疾患用薬、鼻炎用内服薬を含む）、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、催眠鎮静薬等）

## 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気等があらわれることがあります。）

## 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

（動物試験で薬剤の乳汁中への移行が認められています。）

## 5. 服用前後は飲酒しないでください

## 👤 相談すること

## 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の診断を受けた人。

肝障害、気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎

- (6) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人。

## 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

| 関係部位  | 症 状                                   |
|-------|---------------------------------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ                             |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、胃部不快感、腹痛、舌炎                    |
| 精神神経系 | めまい、不眠、頭痛、だるさ、しびれ感                    |
| 循環器   | 動悸、血圧上昇                               |
| 泌尿器   | 排尿困難、頻尿、尿糖                            |
| その他   | むくみ、ほてり、鼻腔内乾燥、胸部圧迫感、体重増加、月経異常、脱毛、味覚異常 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症 状                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、<br>息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |
| 肝機能障害              | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、<br>食欲不振等があらわれる。           |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
口のかわき、眠気、下痢

## 効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：鼻みず、鼻づまり、くしゃみ

## 用法・用量

下記の量を就寝前に水又は温湯で服用してください。

| 年 齢       | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15歳以上) | 1錠      | 1回     |
| 15歳未満の小児  | 服用しないこと |        |

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 花粉などによる季節性のアレルギー性鼻炎の症状に使用する場合は、花粉飛散期に入って症状が出始めた、症状の軽い早めの時期からの服用が効果的です。
- (3) 1週間位服用しても症状がよくなる場合は、医師又は薬剤師に相談してください。また、症状の改善がみられても2週間を超えて服用する場合は、医師又は薬剤師に相談してください。
- (4) 錠剤の取り出し方：  
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## 成分・分量(1錠中)

| 成分・分量     | 働 き                            |
|-----------|--------------------------------|
| エバスチン 5mg | アレルギーによる鼻水、鼻づまり、くしゃみの症状を改善します。 |

〔添加物〕乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) PTPのアルミ箔が破れたり、中身の錠剤が破損しないように、保管及び携帯に注意してください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は  
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

電話受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00



製造販売元 興和株式会社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

Y1277R  
M4K

000000