

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

目のかゆみ、充血などのアレルギー症状に早めに対処したい人におすすめします。

アレルギー専用 **眼科用薬**

日本薬局方：トラニラスト点眼液

# ロートアルガード® プレテクト **要指導医薬品**

「ロートアルガードプレテクト」は、アレルギーによる目のかゆみの発生を防ぐ医療用成分トラニラストを配合したアレルギー専用の眼科用薬です。

## ■ 特長



**Point 1** 目のかゆみにしっかり効く

アレルギー原因物質（ヒスタミンなど）の放出を抑えることができます。



**Point 2** 目のかゆみが出にくくなります

早期使用（花粉飛散の1～2週間前から）により、アレルギー症状の発症を抑えることができます。

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる  
**フリーアングルノズル®**



簡単にアイケアできて、  
とっても便利です。

## 使用上の注意 ⚠

してはいけないこと （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

**1** 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

相談すること

**1** 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 減感作療法など、アレルギーの治療を受けている人
- (5) アトピー性皮膚炎や喘息等のアレルギー体質をもつ小児
- (6) 次の症状のある人
  - はげしい目の痛み、強い異物感
- (7) 眼球乾燥症候群（ドライアイ）の診断を受けた人又はその恐れがある人
- (8) コンタクトレンズを装用している人
- (9) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人

とくに次のような場合はアレルギー以外の原因による症状の可能性があるため、使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- 片方の目だけに症状がある場合
- 目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
- 視力が低下した場合
- 目やにの多い場合

**2** 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

| 関係部位 | 症 状                      |
|------|--------------------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤                    |
| 目    | 充血、かゆみ*、はれ*、刺激感・しみる*、痛み* |

\*目のまわりを含む



- 3 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。  
目のかすみが改善されない場合

## 効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

## 用法・用量

成人(15才以上)及び7才以上の小児：1回1～2滴、1日4回(朝、昼、夕方及び就寝前)点眼してください。

### ● 用法・用量に関連する注意

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目の周囲に流れ出た液はすぐにふきとってください。
- (3)容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。  
〔汚染や異物混入(目やにやホコリなど)の原因となる〕また、  
混濁したものは使用しないでください。
- (4)点眼用에만使用してください。(5)用法・用量を厳守してください。
- (6)花粉など季節性のアレルギーによる症状に使用する場合は、花粉飛散開始の1～2週間前から、又は花粉の飛散期に入って症状が出始めたら、症状の軽い早めの時期からの使用が効果的です。
- (7)1週間位使用しても症状がよくならない場合、また、症状の改善がみられても使用期間が2週間を超える場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。



## 成分・分量

| 有効成分   | 配合量  |
|--------|------|
| トラニラスト | 0.5% |

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ポビドン、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物、エデト酸Naを含有する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。また、過度の低温(冷蔵庫の中等)での保管は避けてください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。



## お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになつてのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたにに応えたい」サポートデスクです。

東京：03-5442-6020 大阪：06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)