

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

目のかゆみ、充血などのアレルギー症状に早めに対処したい人におすすめします。

アレルギー専用 眼科用薬

日本薬局方:トラニラスト点眼液

ロートアルガード[®]プレテクト

第1類医薬品

販売名:ロートアルガードプレテクト

毎年やってくる目のかゆみに悩んでいるあなたへ
抗アレルギー成分のトラニラストがかゆみにWアプローチ

■特長



目のかゆみにしっかり効く

アレルギー原因物質(ヒスタミンなど)の放出を抑えることができます。



目のかゆみが出にくくなります

早期使用(花粉飛散の1~2週間前から)により、アレルギー症状の発症を抑えることができます。

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる
フリーイングルノズル[®]



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

使用上の注意!

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

相談すること



1 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(4) 減感作療法など、アレルギーの治療を受けている人

(5) アトピー性皮膚炎や喘息等のアレルギー体質をもつ小児

(6) 次の症状のある人 ● はげしい目の痛み、強い異物感

(7) 眼球乾燥症候群(ドライアイ)の診断を受けた人又はその恐れがある人

(8) コンタクトレンズを装用している人

(9) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人

とくに次のような場合はアレルギー以外の原因による症状の可能性があるため、

使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

● 片方の目だけに症状がある場合 ● 目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合

● 視力が低下した場合 ● 目やにの多い場合



2 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤
目	充血、かゆみ*、はれ*、刺激感・しみる*、痛み*

*目のまわりを含む

- 3 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
目のかすみが改善されない場合

効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

用法・用量

成人(15才以上)及び7才以上の小児：1回1～2滴、1日4回(朝、昼、夕方及び就寝前)点眼してください。

● 用法・用量に関する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(2) 目の周囲に流れ出た液はすぐにふきとってください。
(3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
〔汚染や異物混入(目やにやホコリなど)の原因となる〕また、
混濁したものは使用しないでください。
(4) 点眼用にのみ使用してください。 (5) 用法・用量を厳守してください。
(6) 花粉など季節性のアレルギーによる症状に使用する場合は、花粉飛散開始
の1～2週間前から、又は花粉の飛散期に入つて症状が始めたら、症状の
軽い早めの時期からの使用が効果的です。
(7) 1週間位使用しても症状がよくならない場合、また、症状の改善がみられて
も使用期間が2週間を超える場合は、医師又は薬剤師にご相談ください。



成分・分量

有効成分	配合量
トラニラスト	0.5%

添加物として、ホウ酸、ホウ砂、ポビドン、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物、エデト酸Naを含有する。

保管及び取扱上の注意

- (1) 高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
また、過度の低温(冷蔵庫の中等)での保管は避けてください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になつたり
品質が変わる)
(4) 他の人と共用しないでください。
(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であつても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。



お問い合わせ先：お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などを
お聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)



ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

401516902